20 Jane 902 et SACHET Nº 103 N 101 necessan willtan ACROCLINIUM ADONIDE **AGERATUM** varié goutte de sang du Mexique grand varié Acroclinium roseum Annuelle. — Composées Adonis æstivalis Annuelle. — Renonculacées Ageratum mexicanum Annuelle, vivace. — Composées Semer en place de mars en juin. On sème également en août-septembre à bonne exposi-

Semer: 1º En septembre en pépinière; repiquer en pots et hiverner sous châssis très près du verre; mettre en place fin avril, en lieu chaud, en espaçant de 25 à 30 cent. 2º En mars-avril sur couche; repiquer de même et mettre en place en mai. 3º En avril-mai sur place, à bonne exposition. Haut. env. 35 cent.

Haut. 25 à 30 cent. Fl. de juillet en août,

Semer: 1º En mars-avril sur couche; repi-quer de même et mettre en place en mai, à bonne exposition en espaçant de 30 à 40 cent. 2º En avril-mai en pépinière au midi, mettre en place en mai-juin. Haut. env. 50 cent Fl. de juin en octobre.



ALYSSE Odorant, corbeille d'argent Alyssum maritimum

Annuelle, vivace en serre. — Crucifères

Semer en place de mars en juillet. On peut aussi semer en septembre ; repiquer dans un endroit abrité pour passer l'hiver. Haut. 30 cent. FI. (blanche) de mai en



variée

Gomphrena globosa Annuelle. — Amarantacées

Semer en mars-avril sur couche; repiquer de même et mettre en place en mai-juin à bonne exposition, en terrain léger et bien fumé, en espaçant de 35 à 40 cent.
Haut. 30 cent.
FI. de juin à octobre.



**ANCOLIE** des jardins double variée

Aquilegia vulgaris Vivace. — Renonculacées

Semer de mars à juin un peu à l'ombre ; repiquer en pépinière; mettre en place à l'automne ou au printemps. Haut. 50 à 70 cent. FI. en mai-juin la 2° année.



**ANÉMONE** des fleuristes simple de Caen variée

Anémone coronaria vace. — Renonculacées Vivace. \_

Semer: 1º Au printemps en pots ou en terrines; repiquer en pépinières; arracher les pattes à la fin de l'été. 2^ En juillet-août. en pépinière; hiverner sous châssis froid; repiquer en pépinière en terre douce et légère. Mettre en place les pattes de préférence

à l'automne ou au printemps. Haut. env. 25 cent. **FI.** tout le printemps.



blanche, plante aux œufs

Solanum ovigerum Annuelle. — Solanées

Semer sur couche en mars-avril: repiquer de même ou en pots tenus sur couche et mettre en place fin mai ; en bonne terre bien fumée et bien exposée en espaçant les plants de 50 à 60 cent. Haut. 40 à 50 cent. Fruits de juin à août.



**BALSAMINE** double variée

Impatiens balsamina flore pleno Annuelle. — Balsaminées

Semer en avril sur couche ou au commence-ment de mai, en pépinière ; repiquer de même ; mettre en place de mai en juin à toutes exposi-tions mais découvertes à l'ombre. Haut. env. 50 cent. FI. de juin à octobre.



BELLE-DE-JOUR

variée (Liset)

Convolvulus tricolor

nuelle. — Convolvulacées

Annuelle. — Convolvulacées

Semer de mars en mai sur couche ; repiquer en juin. On peut semer en place en mai-juin. Haut. 30 à 35 cent. ►I de juillet à septembre.



BELLE-DE-NUIT variée

Mirabilis Jalapa Annuelle. — Nyctaginées

Semer: 1° En avril en pépinière, à bonne exposition, **repiquer** de même et **mettre** en place en mai, en espaçant de 50 cent. 2° En mai sur place à bonne exposition, en terre un peu argileuse.

Haut. env. 1 m. FI. fin juillet en octobre.



**CAMPANULE** à grosse fleur simple variée

Campanula Medium grandiflorum Annuelle. — Campanulacées

Semer en place très clair d'avril en mai en terre légère. Cette variété réussit surtout quand elle est à une exposition demi-ombragée et dans un sol sableux.
Haut. 30 à 40 cent. FI. de mai à juillet.



**CAMPANULE Miroir de Vénus variée** 

Campanula speculum Annuelle. — **Campanulacées** 

Semer sur place ou en pépinière en **avril- mai**, puis **repiquer** les jeunes plants à 10 ou 15 cent. On sème également en septembre en pépinière pour mettre en place à demeure courant mars. Coloris violet-bleu éclatant. Haut. 20 à 30 cent. FI. de mai à juillet.



**CAPUCINE** grande variée (grimpante)

Trop æolum malus Annuelle. — Tropéolées


Semer: 1° En février-mars en pots sur couche; mettre en place en mai sans diviser. 2° Fin avril-mai en place, de préférence, ou en pots et mettre en place sans diviser. Haut. 2 à 3 m. FI. de mai-juin à octobre.



**CAPUCINE** naine variée


**Tropælum** majus var nanum Annuelle. — Tropéolées

Semer : 1° En mars-avril sur couche ou en pépinière bien exposée et abritée; repiquer de même en pots; mettre en place en mai. 2" En avril-mai sur place à bonne exposition. Haut. 30 à 40 cent. FI. de juin à octobre.



**CÉLOSIE** à panache (Triomphe de l'Exposition) variée

Celosia pyramidalis plumosa Annuelle. — Amarantacées



**CHRYSANTHÈME** à carène varié Chrysanthemum carinatum Annuelle. — Composées

Semer : 1° En mars-avril sur couche ou en pépinière à bonne exposition, **repiquer** de même et **mettre** en place en mai. 2° Sur place d'avril en mai. On peut aussi **seme**r en sep-tembre, **repiquer** et **hiverner** sous châssis, **mettre** en place en avril. Haut. env. 50 cent. FI. de juin en septembre.



CENTAURÉE Barbeau Bleuet variée

Centaurea cyanus Annuelle. — Composées

Semer sur place de mars en mai, ou de septembre en octobre ; repiquer le semis d'automne en pépinière à bonne exposition pour passer l'hiver; mettre en place en mars. Haut. 80 à 90 cent. FI. de mai à octobre.



CHRYSANTHÈME à carène hybride de Burridge varié Chrysanthemum carinatum burridgeanum Vivace. — Composées

Semer: 1' De février à avril en serre ou sur couche, en terrines ou en pots, repiquer de même et mettre en place de mai-juin. 2i D'avril en juin en pépinière, repiquer de même et mettre en place préférablement à l'automne ou au printemps.

Haut. 75 cent. à 1 m. FI. de fin septembre à



CHRYSANTHÈME des jardins double varié

Chrysanthemum coronarium flore pleno Annuelle, vivace en serre. -\_ Composées

Semer: 1º En mars-avril sur couche ou en Semer: 1º En mars-avril sur couche ou en pépinière à bonne exposition, repiquer de même et mettre en place en mai. 2' Sur place d'avril en mai. On peut aussi semer en septembre, repiquer et hiverner sous châssis, mettre en place en avril.

Haut. env. 50 cent. FI. de juin en septembre.



CLARKIA élégant double varié Clarkia elegans ielle. — Onagrariées Annuelle. \_

Semer en mars-avril sur place préférablement, ou en pépinière pour repiquer de même et mettre à demeure en avril-mai. On peut aussi semer en septembre-octobre sur place ou en pépinière bien exposée, repiquer en pépinière, mettre en place fin mars-avril. Haut. env. 50 cent. FI. de fin mai à septembre,



COLLINSIA varié

Collinsia **multicolor** Annuelle. — Scrofularinées

Semer : 1º De mars en mai sur place ou bien en pépinière et repiquer en place fin mai. 2º Fin septembre-octobre en pépinière bien exposée, repiquer de même, abriter des grands froids et mettre en place au printemps. Haut. env. 25 cent. FI. de fin mai à août,



élégant varié

Coreopsis elegans Bisannuelle. — **Composées** 

Semer 11" De fin mars en mai sur place ou en pépinière bien exposée, repiquer en pépinière et mettre en place en mai. 2º Fin septembre sur place ou en pépinière, repiquer et hiverner en pépinière à bonne exposition et mettre en place au printemps.

Haut. env. 60 cent. FI. de fin juin à octobre.



COQUELICOT double varié

Papaver **rhœas** Annuelle. — Papavéracées

Semer de février jusqu'à mai ou en septembre-octobre sur place ou en pots qu'on met ensuite en place sans diviser la motte. Haut. 60 cent. FI. de mai en juin. Haut. 60 cent.



**CRÉPIS** varié

Crepis Annuelle. — Composées

Semer en avril en pépinière; mettre en place en mai. On peut semer en place en avril-mai. On sème également en septembre-octobre en place ou en pépinière pour repiquer à demeure au printemps à 15 cent. de distance. Haut. 30 à 35 cent. FI. de mai à septembre.



**COQUELOURDE** des jardins variée

Agrostemma coronaria

Bisannuelle vivace \_ Caryophyllées

Bisannuelle vivace — **Caryopnyllees**Semer en pépinière en mai-juin, repiquer également en pépinière et mettre en place définitivement en automne ou en mars. Cette plante doit être cultivée dans tous les jardins, car elle demande peu de soins et produit de jolies fleurs longuement pédonculées qui sont employées avec succès pour la garniture des vases et la confection des bouquets. Haut. 25 cent. Fl. de mai à juillet.



**CYNOGLOSSE** à feuille de lin

Cynoglossum linifolium Annuelle. — Borraginées

Semer en place en mars-avril ou bien en septembre en pépinière à bonne exposition et mettre en place en avril.

Haut. 30 cent.

FI. (blanc lilas) de mai en septembre.



**DATURA** d'Egypte double varié Datura fastuosa flore pleno Annuelle. — Solanées

**Semer** en mars-avril sur couche, **repiquer** de même en godets ou en pépinière bien exposée, mais en garantissant du soleil les premiers jours; mettre en place en mai. On peut aussi semer fin avril-mai sur place, en lieu chaud. Haut. 50 à 80 cent. FI. de juillet en octobre.



**DIGITALE** Gloxinoïde variée

**Digitalis purpurea**Bisannuelle et vivace. — **Scrofularinées** 

Semer d'avril en juin ; repiquer en pépinière et mettre en place en octobre ou au printemps, en mars-avril.
Haut. 1 m. à 1 m. 30. FI. de juin en août.



DOLIQUE d'Egypte varié Dolichos lablad

Annuelle grimpante. — Papilionacées

Semer très clair sur couche en avril, puis mettre en place fin mai à chaude exposition. Plante grimpante, convenant bien pour l'ornementation des berceaux et treillages. Haut. 3 m, FI. de juillet à septembre



**ESCHSCHOLTZIA** de Californie varié

Eschscholtzia californica Annuelle, vivace. — Papavéracées

Semer en place à l'automne ou de mars en niai. On peut semer en pépinière et repiquer en place. Haut. 30 à 40 cent.

FI. de juin à octobre.



**FICOIDE** tricolore variée Mesembrianthemum tricolor Annuelle. — Mesembrianthémées

Semer en mars-avril sur couche : repiquer Semer en mars-avril sur couche; repiquer de même en pépinière, mettre en place en niai-juin. Semer aussi fin aoul-septembre en pépinière; repiquer en godets; hiverner sous chàssis ou en serre; mettre en place au printemps à exposition chaude. Haut. 10 cent.



**GAILLARDE** peinte variée . Gaillardia picta Annuelle. — Composées

Semer: 1" En mars-avril sur couche ou en avril-mai en pépinière abritée, **repiquer** de même et **mettre** en place en mai. 2º En août-septembre en pépinière, **repiquer** en pots, **hiverner** sous chàssis ; **mettre** en place au

printemps. Haut. env. 45 cent.

FI. de juin en octobre.



tricolore varié

Gilia tricolor Annuelle. -

Semer sur place d'avril en mai. On peut semer l'automne au pied d'un mur et repiquer en mars-avril.

Haut. env. 40 cent. FI. (blanc violet) de juillet



**GIROFLÉE** Quarantaine à grande fleur double variée

Cheiranthus annuus Annuelle. — Crucifères Annuelle. \_

Semer: 1º En mars sur couche ou en avril sous châssis froid; repiquer sous châssis froid ou au pied d'un mur au midi; mettre en place en mai. 2º En avril-mai en plein air sur place ou en pépinière. 3" En septembre, repiquer en pots; hiverner sous châssis froid. Haut. 25 à 30 cent. FI. d'avril en septembre.



**GIROFLÉE** jaune Ravenelle grande fleur simple variée (Viollier)

Cheiranthus cheiri Bisannuelle. — Crucifères

Semer de mai à fin juin en pépinière; repiquer en planches; à l'automne, mettre en place en pots ou en pépinière. On peut attendre au printemps pour mettre en place dés mars. Haut. 40 à 70 cent. FI. de fin mars à mai.



GODETIA

Whitneyi varié

Godetia whitneyi Annuelle. — Onagrariées

Semer en avril-mai sur place ou en pépi-nière; mettre à demeure fin mai-juin en espacant de 30 à 40 cent. **Semer** aussi en septembre-octobre en pépinière bien exposée, **repiquer** de même et **mettre** en place au printemps. Haut. env. 35 cent. **FI**. fin mai à septembre.



**GYPSOPHILE** élégant à grande fleur blanc pur (Mousseline)

Gypsophila elegans alba Annuelle. — Caryophyllees

Semer en place d'avril en mai. On sème aussi en septembre-octobre, repiquer les plants avant l'hiver à bonne exposition. Plante recom-mandable pour la confection des bouquets. Haut. 40 à 50 cent. FI. de juillet en août.



**I MMORTELLE** annuelle double variée

Xeranthemum annuum Annuelle. \_\_ Composées

Semer de mars à mai en place, ou en pépi-nière à bonne exposition, pour repiquer de même et mettre à demeure en mai-juin. Semer aussi fin septembre-octobre en pépinière, repiquer de même à bonne exposition, abriter des grands froids et **mettre** en place au prin-

temps. Haut. 50 cent. FI. de fin juin en octobre.



**IMMORTELLE** à bractée double variée

Helichrysum bracteatum Annuelle. — Composées

Semer de mars à mai en place ou en pépinière à bonne exposition, pour **repiquer** de même et **mettre** à demeure en mai-juin. **Semer** aussi fin septembre-octobre en pépinière, **repiquer** de même à bonne exposition, abriter des grands froids et mettre en place au prin-

temps. Haut. 80 à 90 cent.

FI. de fin juin en octobre.



I POMÉE VOLUBILIS varié (Liseron)

I pomea purpurea Annuelle. — **Convolvulacées** 

**Semer**: 1º En avril-mai sur couche ou sous châssis en pots ; **mettre** en place sans diviser en mai-juin. 2º En mai-juin sur place à bonne exposition

Haut. 2 à 3 m. FI. fin juin à septembre.



**I POMÉE** A grande fleur bleue très hâtive (grimpante)

**Semer :** 1º En avril-mai sur couche ou sous châssis en pots **; mettre** en place sans diviser en mai-juin. — 2º En mai et juin sur place à bonne exposition.



**JULIENNE** de Mahon variée (Mignonnette)

**Hesperis** maritime Annuelle. — Crucifères

Semer: 1º En septembre-octobre de préférence en place, à une exposition abritée, ou bien en pépinière; repiquer au pied d'un mur au midi, et mettre en place en mars-avril. 2º De mars-avril en juin en place de préférence. Haut. 20 à 30 cent. FI. d'avril-mai en août.



**LAVATÈRE** à grande fleur variée

Lavatera trimestres Annuelle. — Malvacées

Semer en avril-mai de préférence en place ou en pépinière, en **repiquant** de même le plant très jeune pour **mettre** en place en mai-juin, en tous terrains et toutes expositions, sauf à l'ombre. Haut. env. 80 cent. FI. de juillet en octobre.



LIN à grande fleur rouge

Linum grandiflorum rubrum Annuelle. — Linées

Semer en place en avril-mai. On peut semer en pépinière en avril et repiquer en mai-juin. en ayant soin de couvrir les plants. Haut. 30 cent. Fl. de mai en octobre.



**LUPIN** annuel en mélange

Lupinus annuus Annuelle. - Papilionacées

Semer de fin avril en juin, en place de préférence, en évitant les terres calcaires qui leur sont nuisibles. On sème souvent les lupins annuels en juin-juillet pour avoir une floraison à l'automne et jusqu'aux gelées.
Haut. 50 à 80 cent. FI. de juin à octobre.



**MAIS** du Japon panaché

Zea mais foliis variegatis Annuelle. — Graminées

Semer: 1° En pots sur couche en avril; mettre en place fin avril ou mai. 2" De fin avril en juin en pépinière en planche, ou mieux en place. Ce dernier mode est le meilleur. Haut. 1 m. à 1 m. 50. FI. de juillet à août.



**LUPIN** polyphylle varié

Lupinus polyphyllus Vivace. — Papilionacées

Semer en avril-mai en place, ou en godets que l'on tient à mi-ombre, puis sous châssis à froid pour passer l'hiver; mettre en place au printemps en espaçant de 40 cent. en tous sens en terre fraiche et profonde. Produit un effet magnifique dans plates-bandes ou massifs. Haut. 75 à 150 cent.

FI. mai à juillet.



**LYCHNIS** Croix de Jérusalem varié

Lychnis chalcedonica /ivace. — Caryophyllees

Semer en mai ; repiquer en pépinière et mettre en place à l'automne. Floraison au printemps suivant. Très bonne plante vivace pour plates-bandes et grands massifs. Haut. 70 à 80 cent. FI. de juin à octobre.



MALOPE à grande fleur variée

Malopa grandiflora Annuelle. — Malvacées

Semer en place d'avril en mai, ou en pépi-nière à la même époque. Fréquents arrosages pendant l'été. Abondante et magnifique flo-raison de juillet à septembre. Haut. env. 1 m. FI. de juillet à septembre,



**MUFLIER** grand varié (Gueule-de-Loup)

Antirrhinum majus Vivace. — Scrofularinées

Semer :1° De juin à septembre en pépinière, repiquer de même à bonne exposition ; abrite- des grands froids, mettre en place en avril mai. 2° En mars-avril en pépinière, repiquer; de même et mettre en place en mai. Haut. env. 60 cent.



MYOSOTIS des Alpes varié (Souvenez-vous-de-moi)

**Myosotis alpestris**Bisannuelle, vivace. — **Borraginėes** 

Semer de juin à septembre en terrines ou en pépinière à mi-ombre ; repiquer en pépinière ; mettre en place à l'automne de préférence ou au printemps. Supporte l'hiver sans abri.

Haut. 20 30 cent.

FI. d'avril en juin.



N ÉMOPHILE Insignis varié

Nemophila Annuelle. — Hydrophyllées

Semer: 1° De mars en juin, en place ou en pots qu'on met à demeure sans diviser. 2° De septembre en octobre en pépinière, repiquer de même, abriter des grands froids; mettre en place en mars-avril. Le semis de printemps est préférable.
Haut. 15 à 20 cent. FI. fin mai à octobre.



NIGELLE

### de Damas double variée

Nigelle damascena Annuelle. — Renonculacées

Semer de fin février en mai, en place ou en potées qu'on met en demeure sans les diviser. On peut aussi semer à l'automne en pépinière bien exposée, repiquer de même et mettre en place dès fin mars, mais le semis de printemps est préférable. Haut. 40 cent.



ŒILLET
de Chine double varié
Dianthus sinensis
Annuelle. — Caryophyllées

Semer: 1º En août-septembre, en pépinière, repiquer de même à bonne exposition, abriter des gelées, mettre en place au printemps. 2º Fin janvier à mars sur couche, repiquer de même; mettre en place en avril-mai. 3º Fin mars-avril sous châssis ou en pépinière bien exposée, repiquer en pépinière, mettre en place dés que les plants sont assez forts. Haut. 20 à 30 cent. FI. de fin mai en septembre.



ŒILLET de poète varié

Dianthus barbatus
Bisannuelle et vivace. — Caryophyllees

Semer d'avril en août en pépinière, en terrines ou en pots; repiquer de même et mettre en place de préférence dès l'automne ou au printemps à bonne exposition. Haut. 30 à 40 cent. FI. de fin mai en juillet.



ŒILLET d'Inde double varié

**Tagetes patula nana** Annuelle. — **Composées** 

Semer: 1º Fin février en avril sur couche, repiquer de même; mettre en place en mai. 2º En avril-mai sous châssis ou en pépinière bien exposée, repiquer en pépinière, mettre en place en mai-juin.

Haut. de 20 à 40 cent. FI. de juillet en octobre.



ŒILLET perpétuel géant Enfant de Nice varié

Semer I 1" En août-septembre en pépinière, repiquer en pépinière au pied d'un mur, ou mieux hiverner sous châssis, mettre en place en mars-avril. — 2" En février-mars sur couche, repiquer sous châssis froid en avril et mettre en place en mai.



PAVOT double à fleur de Pivoine varié

Papaver somniferum Annuelle. — Papavéracées

Semer de février en avril ou de septembre en octobre, en place ou en pots qu'on met à demeure sans diviser, cette plante ne supportant pas la transplantation. Haut. 80 cent. à 1 m.

FI. de fin mai en septembre.



PENSÉE à grande fleur variée beau mélange

Viola tricolor grandiflora Vivace. — Violariées

Semer de juillet en août, repiquer en place en automne, en terre bien préparée et à bonne exposition. Se sème aussi en mars-avril, repiquer en place en mai. Haut. 15 à 20 cent. FI. d'avril en septembre.



ŒILLET Perpétuel à fleurs géantes, race Chabaud varié.

Semer ! 1º En août-septembre en pépinière, repiquer en pépinière au pied d'un mur, ou mieux hiverner sous châssis, mettre en place en mars-avril. — 2º En février-mars sur couche, repiquer sous châssis froid en avril et mettre en place en mai.



PÉTUNIA hybride à grande fleur varié

Petunia hybrida Annuelle. — Solanées

Semer de février en avril sur couche, en terrines ou en pots bien drainés, et en avrilmai en pépinière; repiquer de même en godets de préférence; mettre en place en mai à toutes expositions.

Haut. env. 60 cent. FI. de fin mai en octobre.



PHLOX de Drummond varié

Phlox Drummondi Annuelle. — Polémoniacées

Semer ! 1º Fin septembre en pépinière; repiquer de même ou en godets; hiverner sous châssis; mettre en place fin avril-mai. 2" De février en avril sur couche; repiquer de même; mettre en place en mai. 3° Sur place de fin avril jusqu'à juin.
Haut. env. 50 cent. FI. de fin mai en octobre,



PIED D'ALOUETTE des Blés double varié

Delphinium consolida nuelle. — Renonculacées


**Semer** de février en avril, de préférence sur place ou en pépinière, pour **mettre** en place en avril-mai. On peut aussi **semer** en septembre-octobre en place ou en pépinière ; dans ce dernier cas, lever avec soin en motte pour **mettre** à demeure en mars-avril. Haut. env. 1 m. FI. de fin mai à août.



**POURPIER** à grande fleur variée

Portulaca grandiflora Annuelle, vivace en serre. — Portulacées

Semer en mars-avril sur couche, ou en avril-mai en pépinière, repiquer de même; mettre à demeure en mai à bonne exposition. On peut aussi semer en place en mal. Haut. env. 15 cent.



### PIED D'ALOUETTE nain double à fleur de Jacinthe varié

**Delphinium ajacis minus** Annuelle. — **Renonculacées** Annuelle.

Semer de février en avril, de préférence sur place ou en pépinière, pour mettre en place en avril-mai. On peut aussi semer en septembre-octobre en place ou en pépinière ; dans ce dernier cas, lever avec soin en motte pour mettre à demeure en mars-avril.
Haut. env. 50 cent. Fl, de fin mai à août.



### **REIN E-MARGUERITE** grande pyramidale en mélange

Aster sinensis Annuelle. — Composées

Semer: 1' En pépinière en mars-avril sur semer: 1' En pepiniere en mars-avril sur couche; repiquer sur couche; mettre en place en mai. 2" Fin mars-avril sous châssis froid, sous cloche ou en pleine terre au pied d'un mur au midi ; repiquer en pépinière en pleine terre à bonne exposition; planter en maijuin.

Fil de juin à sentembre.

Haut, 50 à 60 cent. FI. de juin à septembre.



### **POIS DE SENTEUR** race Spencer à grande fleur

ondulée variés Lathyrus odoratus Annuelle. — Papilionacées

: 1' En septembre-octobre, pour Semer fleurir de fin mai à juin. 2' En février et mai. Le semis d'automne produit généralement des plantes vigoureuses. Le Pois de Senteur se cultive très facilement en pots ou en caisse Haut. 1 ni. à 1 m. 50. FI. en juillet-août.



**REIN E-MARGUERITE** naine en mélange

Aster sinensis Annuelle. — Composées

Semer sur couche de mars à mai ou en terre préparée et bien abritée ; repiquer le plant et mettre en place de mai en juin, selon la force du plant et la température, à une distance de 30 à 40 cent.

Haut. 15 à 20 cent. FI. de juillet à septembre.



### RÉSÉDA odorant amélioré pyramidal à grande fleur

Reseda odorata grandiflora
Annuelle. — Résédacées
Semer : 1º Fin août et septembre en pots
ou en pépinière bien exposée, abriter des
gelées, mettre en place au printemps. 2º De
fin février en avril sur couche, en pots ou en
pépinière; mettre à demeure en mai. 3º En
place en plein air de mai en juin. Le repiquage
ne réussit que si on le fait pendant que le plant
est très jeune. est très jeune.

FI. de mai en octobre Haut, env. 25 cent.



**SALPIGLOSSIS** hybride à grande fleur variée

Salpiglossis sinuata Annuelle. — Scrofularinées

Semer en place en avril-mai, en terre saine et légère | graine fine, devra être peu recouverte. Plante d'un contraste magnifique par la varia-tion de ses coloris.

Haut, 60 à 80 cent.

FI. de juillet en août.



### ROSE d'Inde double grande variée

Tagetes erecta Annuelle. — Composées

**Semer**: 1° En mars-avril sur couche, ou en avril-mai en pépinière au midi ; **repiquer** de même et mettre en place en mai. 2° Et préférablement sur place fin avril-mai, à exposition chaude et aérée.
Haut. 70 cent. à 1 m. FI. de juillet en octobre.



**SCABIEUSE** grande double variée

Scabiosa major Annuelle. -Dipsacées

Semer sur couche ou en plein air à bonne exposition en avril-mai ; repiquer en juin. Ou semer en automne et **repiquer** au pied d'un mur. Floraison très abondante. Haut. 40 à 50 cent. Fl. de juin à octobre.



**ROSE TRÉMIÈRE** race Chater's double grande variée

Althaea rosea
Bisannuelle et vivace. — Malvacées

Semer : 1° En janvier-février en serre chaude ou sur couche, repiquer de même en mars et mettre en place en mai-juin. 2° Et préféra-blement de fin avril en juillet en pépinière, repiquer de même ; mettre en place à l'automne ou au printemps. Haut. env. 2 m. FI. de juillet à septembre.



**SAPONAIRE** de Calabre variée

Saponaria Annuelle. — Caryophyllées

Semer sur place en mars-avril. On peut même semer en mai-juin, pour obtenir une floraison en septembre-octobre. Charmante plante à bordures de toute rusticité. S'emploie également avec avantage pour faire des tapis. Haut. 15 à 20 cent. FI. de juin à septembre.



SILÈNE pendula varié

Silene pendula Annuelle. — Caryophyllées

Semer ; 1º De juillet en septembre en place rès clair ou en pépinière; repiquer en pépinière; mettre en place en automne ou au printemps. Floraison en mai-juin. 2° Fin marsavril en place ou en pépinière. Haut. 20 à 30 cent. FI. de juillet en août



VERVEINE hybride à grande fleur variée Verbena hybrida

Annuelle (vivace en serre). — Verbenacées

Semer : 1° En septembre en pépinière, en planches, en pots ou terrines ; repiquer en pots ; hiverner sous châssis en serre tempérée prés du jour; mettre en place fin avril-mal. 2° En mars-avril sur couche; repiquer en pépinière ou en pots sur couche ; mettre en place en mai place en mai. **Haut.** 25 à 30 cent.

FI. de juin en octobre



### **SOUCI** double Mammouth (Mère de famille)

Calendula Annuelle. — Composées

Semer de mars en mai soit sur place en tous semer ut miss et mais seit sur place et nous terrains, soit en pépinière pour repiquer à demeure. On peut aussi semer fin septembre en pépinière, repiquer de méme au pied d'un mur au midi, abriter des gelées et mettre en place au printemps. Haut. 30 à 50 cent. FI. de juin en octobre.



ZINNIA élégant double varié

Zinnia elegans flore pleno Annuelle. — Composées

Semer: 1º En avril sur couche; repiquer sur couche; mettre en place en mai. 2º En avril-mai en pépinière, en planche, en terre légère à bonne exposition; repiquer en place ou en pépinière d'attente. Lever le plant en motte et mettre en place en juin-juillet. Haut. 60 à 80 cent.

FI. de juin jusqu'aux gelées.



THLASPI en mélange

Iberis
Annuelle. — Crucifères

Semer: 1° De préférence en septembre, en pépinière; repiquer de méme à bonne exposition ou sous châssis; mettre à demeure au printemps. 2° En mars-avril sur place ou en pépinière pour repiquer en place dès que les plants auront développé quelques feuilles. Haut. 20 à 30 cent. FI. de fin mai en août.



### **GRAINES DE FLEURS** en mélange

Semer en place au printemps; couvrir peu les graines et presser la terre, il n'est utile d'arroser, pour faciliter la germination, que si le temps est trop sec.

FI. tout l'été.

# **OUTES LES VARI**

LES VARIÉTÉS QUE NOUS VENONS DE VOUS PRÉSENTER EN PLANCHES DE COULEURS. DES PAGES 33 A 72, SONT UNE SÉLECTION D'ESPÈCES RUSTIQUES ET DE CULTURE FACILE ● SUR LA DEMANDE DE NOMBREUX CLIENTS, NOUS AVONS CEPENDANT AJOUTÉ A NOTRE COLLECTION DES VARIÉTÉS DONT NOUS VOUS DONNONS LA LISTE CI-APRÈS, LIVRABLES A NOS CONDITIONS HABITUELLES DE VENTE ET PRÉSENTANT UN INTÉRÊT CERTAIN • ELLES SONT L'OBJET DES MÊMES SOINS DE SÉLECTION ET DE CULTURE ET DONNERONT A NOS CLIENTS LE MAXIMUM DE PRODUITS ET DE QUALITÉ



### 374 ARTICHAUT violet hâtif de Provence (graines).

Ecailles étroites et épineuses. Très bon d'manger cru.

Semer : I° En février-mars en godet sur couche; mettre en place en mai, en terrain sain et substantiel, en espaçant de 80 à 90 cent. —  $2^{\circ}$  En avril-mai, en place, par capots de 3 à 4 graines, pour ne laisser ensuite que la meilleure plante. Abriter du froid. Ne produit que l'année d'après le semis.

**871 ARTICHAUT gros vert de Laon (graines).**Grosse pomme *aplatie à écaille teintée de violet à la* base, réceptacle très *large* et très charnu.

### 00 ARTICHAUT vert de Provence (graines).

Très cultivé dans le Midi. Feuilles étroites écartées à la pointe supérieure Très bon à manger cru.

2019 ARTICHAUT gros camus de Bretagne (graines). La meilleure variété pour cuire, très grosse pomme à écailles vertes brunâtres,

larges et courtes. Pour ces variétés même mode de culture que pour N. 374.

### 376 AUBERGINE violette noire très hâtive de Barbentane.

Fruit cylindrique, noir foncé, plus hâtive que la violette longue.

Semer de fin février à avril sur couche, repiquer sur couche ou sous châssis à froid; mettre en place en mai à une exposition chaude en terrain très richement fumé, espacer de 30 à 40 cm., abriter au besoin.

### 209 AUBERGINE violette naine très hâtive.

La plus hâtive de toutes les variétés.

### 210 AUBERGINE violette ronde.

iété très productive ; fruit sphérique, chair excellente.

### 763 AUBERGINE monstrueuse de New-York (A. violette ronde très grosse). Variété à très gros fruit sphérique violet

## 782 AUBERGINE ronde de Chine (A. noire de Pékin). Variété très hâtive et très productive d fruit rond et énorme.

Pour ces variétés même mode de culture que pour Nº 376.

### 21 1 BASILIC fin vert (Petit Basilic) (des Moines).

Semer :  $\mathbb{I}^0$  en mars-avril sur couche, repiquer en pépinière, mettre en place en mai à une exposition chaude. —  $\mathbb{2}^0$  en avril-mai en pépinière bien exposée, repiquer de même et mettre en place dés que les plants sont assez forts. — 3º En mai sur place.

### 2I2 BETTERAVE à salade, rouge ronde précoce.

Variété hâtive ; racine ronde demi-aplatie, chair bien rouge.

Semer en place d'avril à fin mai, en rayons distants de 36 cm., éclaircir les pieds de 20 à 25 cm. sur la ligne. La terre doit être bien ameublie et bien fumée; il est bon que le fumier soit enterré dès l'automne, pour éviter d'avoir des racines fourchues.

## 2099 BETTERAVE potagère rouge foncé, ronde à feuillage noir. Racine forme toupie, chair très fine et sucrée.

Semer : voir No 212.

### 213 CARDON de Tours (épineux).

Carde très pleine, très épaisse, très épineuse.

Semer sur couche en avril et mettre en place en mai en terre fraîche et bien fumée, à 80 cm. environ en tous sens; à l'automne, on lie les feuilles et on les garnit de paille pour les faire blanchir. Se conserve l'hiver en cave saine à l'abri de la gelée.

### 783 CARDON blanc d'ivoire non épineux

Corde très large et très blanche

Semer: voir No 2 1 3.

### 766 CAROTTE rouge à forcer Parisienne.

Racine plus large que longue, méplate, très hâtive, convenant très bien pour le forçage sous châssis, col et feuillage très fins.

Semer sur couche et en place de décembre à mars et sur costière de mars à mai; dégarnir les pieds en les laissant assez rapprochés (environ 2 à 3 cm.) en tous sens. L'arrachage se fait au fur et à mesure du développement des racines, ce qui permet à celles qui restent de grossir. Arrosages fréquents pendant les chaleurs.

**370 CAROTTE rouge courte de Hollande (Saint-Fiacre) (Crécy).** Précoce, *racine* demi-courte obtuse, excellente variété *pour châssis* et pleine

Semer de février en juillet successivement, clair, en place, à la volée ou en lignes espacées de 15 à 20 cm. environ, en terrain sain **e:** substantiel. Après le semis, serrer la terre et, quand les plants sont bien sortis, les sarcler et les éclaircir s'il y a lieu.

Peut également se semer sous châssis, sur couche, de janvier en mars

214 CAROTTE rouge courte hâtive Bellot (Bourdon) (de Metz).

Très précoce, racine demi-courte plus cylindrique que la carotte de Hollande.

### 784 CAROTTE rouge demi-longue d'Amsterdam.

Carotte très hâtive à châssis, racine demi-longue cylindrique transparente, très rouge, sans coeur.

785 CAROTTE rouge demi-longue de la Halle (sans cœur), Variété très hâtive à racine demi-longue, très rouge, obtuse et sans cœur,

Pour ces variétés même mode de culture que pour Ne 370.

### 371 CAROTTE rouge demi-longue de Luc.

Bonne variété productive renflée au collet

Semer en place et en pleine terre de mars en juin, en terre bien préparée et fumée, éclaircir les plants en laissant entre eux 4 ou 5 cm. de distance Arrosages fréquents pendant les chaleurs afin d'obtenir des racines tendres. Arrachage fin octobre.

Les racines se conservent en les mettant debout dans une cave ou tout autre endroit abrité en les recouvrant de terre

### 882 CAROTTE rouge demi-longue de James.

### 299 CAROTTE rouge longue lisse de Meaux.

Excellente variété de pleine terre, racine longue, cylindrique et sans cœur.

### 767 CAROTTE rouge longue obtuse, sans cœur.

Racine très rouge et cylindrique saris cour

## 300 CAROTTE rouge (ou jaune orange) longue à collet vert.

377 CAROTTE jaune longue obtuse de Lobbérich,

### Longue, obtuse, cylindrique.

301 CAROTTE jaune demi-longue obtuse du Doubs.

Racine cylindrique obtuse à choir et peau très jaunes Pour ces variétés même mode de culture que pour Nº 371.

### 215 CAROTTE blanche longue à collet vert hors terre améliorée

(p. lapins). Le plus recommandée sous tous les rapports, racine très lisse, sortant un tiers hors terre, arrachage facile.

Semer en place à la volée ou en rayons distants de 30 cm. de mars à mai : éclaircir en distançant les plants de 12 à 15 cm. sur la ligne ; binages fréquents pendant l'été,

### 216 CAROTTE blanche demi-longue des Vosges.

Racine plus courte, plus large et plus enterrée que la carotte blanche d collet

Cette variété convient surtout aux sols peu profonds et donne un fort rendement en racines tris nutritives. Semer : voir N° 215.

217 CÉLERI plein blanc doré (Chemin). Côte large et pleine. Côte et feuillage d'un jaune doré.

Semer : I° En février-mars sur couche, repiquer sous châssis ou en plate-Seiner: 1° En reviter-finals Sur Couche, repiquer sous classification place bande abritée, mettre en place en mai-juin. — 2° D'avril en juin en pépinière, mettre en place de juin en juillet, espacer de 30 cm.

Blanchit sans attacher ni butter.

**768 CÉLERI Pascal plein blanc.**Côte très *épaisse, très chamue, feuillage bien vert.* 

Semer sur couche en mars ou en pleine terre en avril, dans un sol bien pré-paré, frais et bien fumé ; mettre en place en mai-juin à 30 cm. en tous sens Donner un paillis et de fréquents arrosages en été.

### 2103 CÉLERI plein blanc frisé.

Plante courte d côtes épaisses et charnues. Feuillage frisé vert

Semer : voir N° 768.

## 378 CÉLERI violet de Tours (plein violet). Côte bien pleine, tendre, violacée.

Semer : voir N° 768.

302 CÉLERI à couper (à soupe) (vert) (creux).

Les feuilles se coupent très jeunes, pour assaisonnement.

Semer : I° En février-mars sur couche ; repiquer sous châssis ou en plate-bande abritée ; mettre en place en avril-mai. — 2° D'avril en juin en pépi-nière ; mettre en place de juin en juillet ; espacer de 40 cm. Se coupe au fur et à mesure des besoins.

### 218 CÉLERI-RAVE géant de Prague.

Très gros, d racine arrondie

Semer : 1° En février-mars sur couche et sous <code>châssis</code>, mettre en place en bon terrain frais, en espaçant de 30 à 40 cm., consommer de fin juillet en septembre. —  $2^{\circ}$  En avril-mai, en pépinière, mettre en place en mai-juin

219 CERFEUIL frisé ou double (vrai). Employé de préférence au cerfeuil commun pour décorer les plats.

Semer successivement de mars à octobre, sur place, à la volée ou en rayons espacés de 30 cm.

## **220 CHICORÉE frisée d'été race Parisienne (d'Italie).**Compacte *et serrée, convient à la* culture d'été.

Semer d'avril en juillet en bonne terre, puis repiquer à 30 cm. de distance environ un mois après le semis. Quand le planta atteint son entier développement on blanchit en recouvrant en partie de feuilles mortes ou de paille suivant les besoins une huitaine de jours avant de consommer.

### 379 CHICORÉE frisée fine d'été race d'Anjou (Grosse Simone).

Variété rustique, d pomme compacte, épaisse, côte blanche lente à monter.

380 CHICORÉE frisée d'été cœur jaune.

Belle race très rustique, à cœur bien plein, jaunissant naturellement,

221 CHICORÉE frisée grosse pancalière. Feuillage très épais, blanchissant facilement sans être liée.

222 CHICORÉE frisée fine de Louviers (très fine).

Très belle sorte formant une petite pomme bien serrée, d cœur très plein.

### 381 CHICORÉE frisée fine de Gullande.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N. 220.

# 223 CHICORÉE frisée, toujours blanche, à cœur plein (endivette). jeune, peut servir de salade d couper. Fournit également une pomme très pleine, très serrée, d'un jaune doré, qui n'a pas besoin d'être blanchie.

Semer de juin en août, successivement, en pépinière ; mettre en place en terrain substantiel, en espaçant de 30 à 40 cm. Cette sorte est blanche normalement, il n'est donc pas besoin de faire blanchir.

303 CHICORÉE frisée mousse verte.

Petite pomme très serrée, d feuillage très découpé.

### 304 CHICORÉE frisée impériale blonde (d'été jaune).

Belle sorte d feuillage large, bien frisée, blanc

Pour ces variétés même mode de culture que pour N. 220.

2070 CHICORÉE frisée Reine d'hiver. Variété intermédiaire entre les chicorées frisées et les scaroles.

Semer de juin en août, successivement, en pépinière : mettre en place en terrain substantiel, en espaçant de 30 à 40 cm. Conserver l'hiver en lieu sain à l'abri du froid. On blanchit en attachant les feuilles, etc.

# 224 CHICORÉE SCAROLE blonde, à cœur plein (à feuille de laitue). Sorte se rapprochant de la Scarole ronde verte, d cœur plein mais d feuille très blonde et plus tardive.

Semer de juin en août, successivement, en pépinière ; mettre en place en terrain substantiel, en espaçant de 30 à 40 cm.

888 CHICORÉE SCAROLE grosse bouclée.

La plus grosse des scaroles d cœur bien fourni, sustique,

Semer: voir N. 224.

### 382 CHICORÉE SCAROLE en cornet de Bordeaux (Béglaise).

Variété plus blonde et plus volumineuse que la chicorée scarole en cornet race d'Anjou.

Semer d'avril à juillet pour repiquer les jeunes plants à 30 cm. de distance environ un mois après le semis, dans une terre bien fumée et préparée; pailler les plants afin de conserver la fraîcheur de la terre. Supporte bien les froids.

2108 CHICORÉES et SCAROLES en mélange.

Permet d'avoir des salades toute l'année dans un espace restreint.

Semer : voir Nº 224.

## 383 CHICORÉE A GROSSE RACINE ou à café (race de Magdebourg) Racine lisse, charnue, de 25 d 30 cm., collet fin, feuille entière.

Semer : I° d'octobre en février, sous châssis, sur couche. - 2° de mars en août successivement en pleine terre, à la volée ou en rayons espacés de 25 à 30 cm.

762 CHICORÉE SAUVAGE pour lapins.
Variété d très larges feuilles, excellente pour la nourriture des lopins.

Semer d'avril à juin sur place. Récolter en coupant les feuilles

### 891 CHOU très précoce pointu de Châteaurenard.

Le plus précoce des choux pointus

Semer : I° en août-septembre, en pleine terre en pépinière, repiquer en pépinière, planter en automne dans les terres saines, chaudes et légères ou au printemps dans les sols humides et froids. Terrain profond, meuble et frais, fumé abondamment. Récolte fin avril-mai.

### 786 CHOU tris hâtif de Louviers.

Variété se rapprochant du chou cœur de boeuf moyen mais d pomme plus large et plus arrrondie, un peu moins précoce.

Semer : voir N° 891.

### 225 CHOU coeur de boeuf moyen de la Halle (Roi des précoces).

Variété à pomme large et courte en forme de cœur.

Semer: 1º en février-mars sur couche et sous châssis ou en pépinière bien exposée et abritée. — 2º de fin mars en juin en pépinière, repiquer dés que les plants ont 3-4 feuilles et mettre en place lorsqu'ils sont assez forts, en bonne terre, bien fumée, en espaçant de 50 cm. environ; conserver l'hiver. — 3º en septembre, repiquer et hiverner en pépipière; mettre en place au printem ps.

## 305 CHOU pommé précoce de Tourlaville (Prompt de Caen). Variété à pomme assez haute, pointue. Convient pour la culture de primeurs

précoces et vigoureuses.

226 CHOU d'York petit (hâtif).

Très hâtif; feuillage vert foncé. Feut se planter très serré.

## 227 CHOU coeur de bœuf petit (Camala) (Aphox) (de Dieppe). Excellente variété se formant de bonne heure.

Pour ces variétés même mode de culture que pour Nº 225.

**2110 CHOU Nantais pointu.**Très précoce, d feuillage court, pomme très serrée, pointue.

Semer : voir N° 891.

**384 CHOU pain de ....... (Chicon).**Pomme longue en forme de pain de sucre allongé. Sorte précoce.

**306 CHOU d'Ingreville.**Chou demi-hâtif, pomme pointue assez haute.

## 307 CHOU pommé plat de Paris (plat d'été). Sorte d pied très court, pomme très dure, aplatie.

228 CHOU d'York gros.

Pomme oblongue, variété très rustique.

## 204 CHOU bacalan gros (bacalan tardif) (de Tours). Variété légèrement plus grosse que le chou bacalan hâtif, plus tardive.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N. 225.

### 229 CHOU très gros de Lorraine (de Schweinfurt). Variété la plus volumineuse des choux cabus

Semer : de fin mars à juin en pépinière; repiquer dès que les plants ont 3-4 feuilles et mettre en place lorsqu'ils sont assez forts, en bonne terre bien fumée, en espaçant de 50 60 cm.; conserver l'hiver.

## 230 CHOU Joannet (Nantais) gros (Joannet tardif) (Colas tardif).

231 CHOU de Saint-Denis (ou de Bonneuil) (Cabus gros de Laon.) (des Quatre Saisons). Variété rustique d'automne et d'hiver, pomme ronde aplatie, très serrée,

légèrement violacée au sommet

## 2072 CHOU Gloire des Flandres (Gloire d'Enkhuizen). Variété à grosse pomme ronde et bien ferme,

### 385 CHOU quintal d'Auvergne (géant des Causses). Volumineux et tardif

# 386 CHOU de Habas. Demi-hâtif d pied court, grosse pomme blonde cloquée et peu serrée.

### 232 CHOU de Dax.

### 308 CHOU de Mortagne blanc.

Pied court, belle grosse pomme aplatie et blanche.

309 CHOU de Hollande tardif (blanc). Variété très rustique, résistant bien ou froid, belle pomme aplatie; très serrée.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 229.

233 CHOU de Vaugirard (d'hiver).

Très rustique, un des meilleurs pour conserver en terre l'hiver, pomme bien ferme.

Semer en juin pour repiquer en pépinière d'attente et mettre en place en août-septembre. Variété rustique, très résistante au froid surtout lorsqu'elle n'est pas trop pommée au moment des fortes gelées.

**310 CHOU de Noël (Chou ardoisé).**Très rustique, résistant bien au froid intense, pomme aplatie légèrement violacée.

892 CHOU rouge petit d'Erfurt. Variété d pomme très rouge, très dure

### 2112 CHOUX pommés en mélange.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 233.

### 234 CHOU DE MILAN Crée hâtif de la Saint-Jean (de Vendôme). Variété d pomme allongée, excessivement hâtive

Semer: I° en février-mars sur couche et sous châssis ou en pépinière bien exposée et abritée. — 2° de fin mars à juin en pépinière; repiquer dès que les plants ont 3 ou 4 feuilles et mettre en place lorsqu'ils sont assez forts, en bonne terre bien fumée, en espaçant de 40 cm. environ.

### 387 CHOU DE MILAN coeur de boeuf frisé.

Variété précoce, pomme en forme de cœur de bœuf.

Semer : I° en février-mars sur couche et sous châssis ou en pépinière bien exposée et abritée. — 2° de fin mars à juin en pépinière, repiquer dès que les plants ont 3 ou 4 feuilles et mettre en place lorsqu'ils sont assez forts, en bonne terre bien fumée, en espaçant de 50 à 60 cm.; conserver l'hiver.

## 235 CHOU DE MILAN hâtif d'Aubervillier (des Vertus hâtif). Variété analogue au Chou de Milan des Vertus, mois plus hâtive et plus fine-

ment cloquée.

## 388 CHOU DE MILAN rustique de Caen (ordinaire) (Pousse Neige). Variété très rustique, venant très bien en plein champ, très résistant.

311 CHOU DE MILAN tête de fer. Variété demi-tardive, bien rustique, pomme ronde de moyenne grosseur bien ferme.

## 312 CHOU DE MILAN pancalier de Touraine (rosette de Cambrai). Pomme ronde assez volumineuse, variété très rustique.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 387.

236 CHOU DE MILAN de Norvège (d'hiver).

Extrémement tardif et très dur d la gelée, pomme ronde, se teinte de rouge violacé pendant l'hiver.

Semer en mal-juin pour repiquer en pépinière d'attente et mettre en place en août-septembre. Variété rustique, très résistante au froid.

389 CHOU DE MILAN Victoria (d'hiver).
Variété tardive résistant très bien au froid, pomme ronde serrée de grosseur

787 CHOU DE MILAN Cressonnier.

Variété rustique et tardive à pied court ; pomme plate très serrée.

### 2116 CHOUX DE MILAN en mélange.

## 2073 CHOU A GROSSES COTES (Ch. à beurre). Variété à celtes et feuilles larges et charnues ne pommant pas. Supporte bien

l'hiver.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 236.

390 CHOU DE BRUXELLES haut (ordinaire).

Variété tardive donnant de nombreuses petites pommes serrées, hauteur 0º 80 environ.

Semer de mars en juin. Repiquer dés que les plants sont bien développés en terrain très richement fumé. Espacement des rayons, 60 cm.; des plants sur les rayons, 40 cm.

237 CHOU FRISÉ vert grand (d'Ecosse). Résiste aux plus grands froids, tige de  $I^{\ \ \ }$  d  $I^{\ \ \ }$ 50.

Semer de mai en juin en pépinière; repiquer en pépinière ou mettre en place en bon terrain, en espaçant de 50 à 60 cm. en tous sens.

### 391 CHOU FRISÉ demi-nain.

Tige de 30 40 centimètres environ.

Semer : voir N° 237.

## 2118 CHOU FRISÉ vert à pied court. Race naine très frisée, vert foncé.

Semer : voir N° 237.

314 CHOU FOURRAGER moellier blanc (gros gigot).

Tige I "50 très renflée, consommée comme les feuilles, constitue un excellent fourrage.

Semer en pleine terre de mars en mai, mettre en place en juin-juillet. Cette variété est assez sensible aux froids. Après avoir cueilli toutes les feuilles su fur et à mesure des besoins, on devra rentrer les tiges qui peuvent servir à l'alimentation du bétail pendant la mauvaise saison

### 392 CHOU FOURRAGER moellier rouge.

Même qualité que le chou moellier blanc, à tige violacée et résistant mieux d la gelée.

Semer : voir N° 314.

### 238 CHOU FOURRAGER branchu du Poitou.

Choux très ramifié et très fourrage

Semer en pleine terre de mars en mal, repiquer en juin-juillet. En hiver, on cueille les feuilles pour alimenter les bestiaux. Cette variété résiste bien au froid.

### 313 CHOU FOURRAGER Cavalier vert.

Tige I "50 d 2", fourrage abondant résistant d la gelée.

393 CHOU FOURRAGER Caulet de Flandre (Cavalier rouge). Variété très résistante ou froid ; analogue au chou Cavalier vert, mais légèrement moins haut. Pied rouge, feuillage rougeâtre.

### 788 CHOU FOURRAGER de la Sarthe.

Tige de I -20 d I "50, feuilles très larges et cloquées.

Pour ces variétés mime mode de culture que pour N° 238.

## 2117 CHOUX en mélange. Mélange de toutes les variétés.

Semer : voir N° 237.

## 769 CHOU-FLEUR nain extra-hâtif (Boule de Neige). Variété très hâtive, convenant très bien pour châssis et primeurs.

Semer: I° en septembre-octobre en pépinière; repiquer en pépinière sous châssis; mettre sur couche chaude pour récolter dès avril, ou en pleine terre en mars-avril en terre fraiche et substantielle, en espaçant de 70 cm. environ. — 2^ en février-mars sur couche; repiquer sous châssis ou sous cloche; mettre en place en avril-mal. — 3° d'avril en juin en pépinière; mettre en place de juin à juillet. — Arroser copieusement pendant les chaleurs.

239 CHOU-FLEUR nain très hâtif d'Erfurt (Chou-fleur Express).

Pomme très blanche, grain fin et très hâtif convenant parfaitement pour primeurs.

Semer : voir Nº 769.

### 241 CHOU-FLEUR Lecerf.

Variété hâtive de pleine terre, pomme volumineuse d grain fin résistant bien d la sécheresse.

1° Se sème sur terreau, à l'ombre, de fin mai à juin, mettre en place en terre bien fumée sans que le plant ait été repiqué; arrosages fréquents pendant la végétation et récolte en octobre-novembre. — 2° Se sème également en octobre pour hiverner sous châssis; on devra alors mettre en place en janvier-février à raison de 6 pieds par panneau.

### 789 CHOU-FLEUR Incomparable.

Très bonne variété hâtive de pleine terre.

Semer : voir N° 241.

### 240 CHOU-FLEUR demi-dur de Paris.

Pomme volumineuse très blanche se conservant bien.

Semer : voir N° 241.

### 394 CHOU-FLEUR de Noël.

Belle pomme d grain fin et serré. Variété très estimée.

Semer ; I° en septembre-octobre; repiquer sous châssis; mettre sur couche chaude pour récolter dès avril. — 2° en février-mars sur couche; repiquer sous châssis; mettre en place en avril-mai.

2001 CHOU-FLEUR géant Primus.

Grosse pomme très blanche, bien protégée par les feuilles, se récolte en septembre.

Semer clair en pleine terre d'avril à mai, mettre en plate en bon terrain bien fumé sans repiquer les plants.

### 242 CHOU-FLEUR géant d'automne (géant de Naples hâtif).

Pomme ferme, énorme, bien blanche, excellente variété méridionale pour récolter en octobre. Plus au Nord, semer en février-mars.

Semer de fin avril jusqu'en juin en pépinière, repiquer en **place en espaçant de 80 cm.** environ, en bonne terre riche en fumure, meuble et fraiche. Arroser copieusement pendant les chaleurs.

### 790 CHOU-FLEUR géant de Naples hâtif à pied court.

Belle variété un peu moins hâtive que le géant d'automne

Semer : voir N° 242.

## 770 CHOU-FLEUR géant de Naples tardif. Pommant bien dans les régions de la Bretagne et du Midi.

Semer: voir N° 242.

### 247 CHOU BROCOLI de Pâques (Pascalin).

Très bonne variété, convenant très bien aux pays méridionaux.

Semer d'avril en juillet en pépinière et mettre en place cinq à six semaines après le semis à 0 m. 80 en tous sens. A l'entrée de l'hiver, coucher les plants en cas de grand froid. En mars, remettre en place, récolte quelques semaines

### 248 CHOU BROCOLI de Roscoff hâtif.

Belle variété d grain fin, pomme blanche, maturité février-mars suivant

### 249 CHOU BROCOLI de Roscoff tardif.

Belle variété très rustique. Même qualité que le chou brocoli de Roscoff hâtit, maturité avril.

### 244 CHOU BROCOLI extra hâtif d'Angers ou de Saint-Laud.

Variété d grosse pomme, grain très fin.

## 243 CHOU BROCOLI hâtif d'Angers (d'hiver) (de Saint-Laud). Même qualité que le précédent, 10 d 15 jours moins hâtif.

### 245 CHOU BROCOLI tardif d'Angers ou de Saint-Laud.

Maturité courant mai donnant une pomme bien couverte, blanche et de grain

## 791 CHOU BROCOLI extra-tardif d'Angers ou de Saint-Laud. Très rustique, maturité mi-juin.

### 315 CHOU BROCOLI blanc Mammouth.

Très belle variété, pomme volumineuse bien blanche, très rustique.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 247.

2120 CHOUX-FLEURS en mélange. Mélange de toutes sortes de choux-fleurs et de brocolis.

Semer : voir N° 241.

## 395 CHOU-NAVET blanc lisse à courte feuille (à potage). Jolie racine lisse-mi-plate, excellente variété potagère.

Semer d'avril en juin en place en espaçant de 30 cm. environ. On peut aussi semer en pépinière et mettre en place jusqu'en juillet. Arracher à l'approche des gelées et conserver à l'abri du froid.

316 CHOU-NAVET blanc d'Aubigny à collet vert.

Très jolie racine oblongue, très rustique et très résistante, chair blanche.

317 CHOU-NAVET blanc d'Aubigny à collet rouge. Même qualité que le précédent, n'en diffère que par la couleur violacée du collet

## 318 CHOU-NAVET RUTABAGA jaune lisse à potage (courte feuille). Racine mi-plate très lisse, variété très hâtive, de saveur agréable.

## 792 CHOU-NAVET RUTABAGA jaune plat hâtif. Belle variété hâtive à racine plate.

## 250 CHOU-NAVET RUTABAGA jaune Champion à collet rouge. Même qualité que le précédent, donnant un fourrage très abondant et

très nutritif.

397 CHOU-NAVET RUTABAGA jaune ovale à collet rouge. Racine se formant très rapidement, pomme ovale allongée à collet teinté de violacé. Race très recommandable, chair jaune.

**396 CHOU-NAVET RUTABAGA jaune de Saint-Marc.** *Très belle race* pour *potage, racine aplatie, chair jaune* savoureuse.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 395.

### 251 CHOU-RAVE violet hâtif de Vienne.

jolie racine à feuille fine

Semer en pépinière de fin avril à fin mai et repiquer en juillet-août; arrosages fréquents pendant l'été pour obtenir des choux tendres. Bon à consommer deux mois après la plantation.

398 CHOU-RAVE blanc Goliath.
Variété tardive, et très rustique, plus volumineuse que les races blanc hâtif et violet hâtif de Vienne.

Semer : Voir N° 251.

## 793 CHOU-RAVE violet géant tardif Goliath. Pomme plus grosse que les deux races précédentes, plus tardive, feuillage

plus fort.

Semer : Voir N° 251.

### 319 CIBOULETTE (Civette) (fausse échalote) (appétit) (Cive) (Bre-

Saveur plus fine que la ciboule. Très utilisée sous le nom de fines herbes.

Semer en mars-avril, clair en place, ou en août-septembre en pépinière pour repiquer en place de préférence dès l'automne ou printemps. S'emploie comme

### 320 CITROUILLE de Touraine (grosse longue).

Fruit très volumineux, allongé, donnant une chair très nourrissante.

emer en petits pots d'avril en mai, mettre en place fin mai 🗎 3 métres de distance environ. On devra pour cela enlever le pot et planter la motte en ayant soin de ne pas laisser tomber de terre.

### 296 COLZA (Chou Colza).

ourrage ires abondant, très rustique et de culture très facile.

Semer: 1° En février-mars 'sur couche et sous chassis ou en pépinière bien exposée et abritée. — 2° De fin mars en juin en pépinière. — 3° En septembre, repiquer et hiverner en pépinière: mettre en place au printemps.

## 771 CONCOMBRE blanc très gros de Bonneuil. Fruit lisse volumineux, cylindrique, hâtif.

Semer : I° En février-mars sur couche et sous châssis en godets, en mai repiquer en pleine terre. — 2º En avril-mai sur place dans une poche de terreau. Espacer de 80 cm. à I métre. Terrain bien fumé. Arrosages copieux.

## **321 CONCOMBRE vert demi-long productif.**Variété demi-hâtive, très productive et très vigoureuse, fruit allongé d'envi-

ron 20 centimètres

### 2122 CONCOMBRE vert long productif.

Demi-hâtif, fruit long cylindrique.

### 2123 CONCOMBRE vert long Serpent Allemand.

Fruit très long, souvent recourbé, chair épaiss

2124 CONCOMBRE vert long Maraîcher. Hâtif, fruit lisse, fin long très vert, convient pour châssis.

## 2003 CONCOMBRE vert très long de Chine. Fruit vert pâle, très lisse, à chair fine, très productif.

## 2127 CONCOMBRE en mélange. Mélange des sortes ci-dessus.

### 252 CORNICHON fin de Meaux (long).

Excellente variété très fine, donnant un fruit allong 4,

322 CORNICHON amélioré de Bourbonne (long) (épineux).

Belle variété très productive donnant un joli cornichon long et mince d' chair

### 2189 CORNICHON vert de Montlhérv.

Fruit allongé très fin liss

### 2128 CORNICHONS en mélange.

Mélange de concombres à confire.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N. 771.

399 COURGE musquée d'hiver de Provence.

D'excellente conserve, très pleine et chair très épaisse.

Semer : I° 'En février-mars sur couche et sous chassis en godets en mai repiquer en pleine terre. — 2° En avril-mai sur place dans une poche de terreau. Espacer de 80 cm. à I m. Terrain, bien fumé. Arrosages copieux.

2075 COURGE de Nice à fruit rond (Cougourdon),
Plante non coureuse produisant des fruits ronds se consommant lorsqu'ils
sont encore jeunes.

## 712 COURGE blanche non coureuse ou de Virginie. Très hâtive, fruit long et blanc. S'utilisant d demi formé.

### 794 COURGE pleine de Naples.

Fruit allongé à peau vert foncé, étranglée vers le milieu.

714 COURGE brodée galeuse.
Fruit de forme ronde à chair orange portant de nombreuses excroissances grisâtres.

### 323 COURGE Giraumon Turban (ou bonnet de Turc).

Variété caractérisée par sa forme spéciale présentant un renflement en forme de calotte. Chair jaune orangée farineuse et sucrée.

### 2130 COURGES en mélange de variétés à courgettes.

Excellente variété très fine, donnant un fruit allongé

Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 399.

324 CRESSON alénois frisé( crépu).
Même emploi que cresson alénois commun, feuillage plus fin, plus tardif.

Seiner successivement de mars à octobre sur place, à la volée en rayons espacés

2132 CRESSON alénois à large feuille.

Diffère des sortes précédentes par la largeur de ses feuilles non découpées

Semer: Voir Nº 324.

### 253 CRESSON de Fontaine

Variété très connue, s'emploie aussi bien en salade qu'en potage et pour décoration de plats.

Semer d'août en septembre ou de mai à juin, dans les fossés à pente légère Quand la plante est bien développée, on submerge le fond de la fosse en ayant soin d'établir un courant d'eau constant. Cueillir au furet à mesure des bésoins.

## 325 CRESSON de jardin (de terre) (vivace) (boulanger). Beaucoup d'analogie avec le cresson de fontaine, en diffère en ce qu'il est cultivé

Semer de mars en août-septembre en place, clair, ou mieux en pépinière, et mettre en place en terre fraîche et substantielle, en espaçant de I 5 à 20 cm. Récolte presque toute l'année.

### 796 ÉPINARD à Feuille de laitue (graine ronde).

Feuille cloquée très large

Semer : I° Successivement de février en mai et de fin juillet en novembre, clair. en bon terrain sain et chaud pendant la mauvaise saison; frais et ombragé pendant les chaleurs. —  $2^\circ$  De novembre en février sur couche et

**326 ÉPINARD géant d'hiver.**Très rustique, d'un très gros rendement, feuille large très épaisse d'un très joli vert, très recommandable.

### 327 ÉPINARD princesse Juliana.

euille épaisse, arrondie, cloquée de couleur vert foncé et luisante, très lent monter.

2011 ÉPINARD d'été de Rueil gr. ronde. Variété vigoureuse et rustique, très recommandable pour la culture d'été par so résistance d la sécheresse et sa grande lenteur à monter, feuilles nom-breuses vert foncé.

2133 ÉPINARD vert de Massy Feuilles larges arrondies, vert foncé, pour l'automne.

### 798 ÉPINARD d'Angleterre très large (graine piquante). Variété très vigoureuse, convenant très bien aux semis de printemps. Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 796.

254 FENOUIL doux long (long de florence). On consomme la base des tiges, qui, très épaisse et renflée, constitue une sorte de bulbe de saveur très agréable.

Semer de mars en juin, en place ou en pépinière en rayons, puis repiquer à 50 centimètres en tous sens; biner et arroser fréquemment. Léger buttage pour faire blanchir la base de pétioles donc l'agglomération constitue la partie alimentaire de cet excellent légume.

372 SALADE en mélange (Mesclun).

Composé d'un mélange de laitue de printemps, cresson de jardin, les jeunes plants sont consommés en salade, non repiqués.

### 716 LAITUE à forcer de Milly (Cordon rouge am.) (graine blanche). Pomme blonde à bord rouge de grosseur moyenne convenant pour culture sous

Semer I I° En février-mars sur couche ou en pépinière abritée; repiquer et mettre en place en mars-avril à bonne exposition.— 2° En octobre-novembre en pépinière abritée; repiquer sur couche et sous châssis. On peut aussi semer clair ou en association avec radis, carottes, oignons, etc., pour récolter directement.

### 772 LAITUE gotte à châssis (graine noire).

Jolie petite laitue pour culture forcée

### 850 LAITUE à bord rouge (Laitue Cordon rouge) (graine blanche) Pomme pleine et serrée.

## **328 LAITUE gotte jaune d'or (graine blanche).**Très jolie pomme dorée plus grosse que la précédente.

851 LAITUE Lebœuf.

Variété présentant beaucoup d'analogie avec la laitue sucrine donnant une pomme très serrée d'un vert glauque.

### 255 LAITUE gotte lente à monter (graine noire).

Pomme légèrement plus grosse que la laitue gotte à graine noire, très recom-mandable pour le printemps et l'été, variété se tenant longtemps sons monter.

717 LAITUE gotte blonde Tom Pouce (graine noire) ( Wheeler). Très employée pour la culture sous châssis. Petite pomme vert foncé, très ferme, se tenant bien, très cloquée.

849 LAITUE du bon jardinier (graine blanche).
Grosse pomme serrée blonde, légèrement tachée de rouge, variété tardive, rigoureuse et résistant aux maladies.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N. 716.

### 329 LAITUE BATAVIA brune Grenobloise (graine blanche).

Très bonne variété d'été, pomme très serrée, feuillage à bord frisé, à fond vert lové de brun.

Semer sur couche de février à fin mars et en terre légère bien abritée d'avril en juillet; avoir soin surtout de repiquer le plan très jeune à 25 cm. de distance, recouvrir la terre de bon paillis et arrosages fréquents en été.

## 331 LAITUE BATAVIA de Pierre-Bénite (Clermone) (grain e blanche) Laitue à bord frisé, pommant parfaitement, bien croquante.

### 330 LAITUE BATAVIA blonde (bord rouge) (graine blanche).

Variété volumineuse montant lentement

## **2138 LAITUE glaciale de Laibach gr. bl.**Feuilles à bord frisé teinté de rouge, pomme volumineuse, très lente d monter

## **256 LAITUE blonde du Cazard (graine noire).**Pomme ferme *d'un vert blond,* lente à *monter.*

## 718 LAITUE blonde de Chavigné (graine blanche). Hâtive et lente à monter.

### 719 LAITUE blonde pionnet des quatre saisons (graine blanche).

### 720 LAITUE blonde de Versailles (graine blanche).

### 2134 LAITUE blonde de Touraine L. de Berlin gr. noire.

Volumineuse assez hâtive, blonde : pomme bien pleine

721 LAITUE grosse Normande (graine jaune).

Excellente variété d'été d grosse pomme et à feuilles amples et grosses, d'un beau vert glauque.

## 2136 LAITUE passe-partout L. blonde glorieuse, gr. noire. Pomme blonde, grosse, ferme ; lente à monter.

### 332 LAITUE grosse brune paresseuse (Bapaume) (grosse grise) (graine noire)

Variété très rustique, pomme assez volumineuse teintée de brur

# 333 LAITUE grosse brune têtue (Troskopf brune) (graine blanche). Très jolie race, donnant rapidement une belle pomme bien serrée, vert foncé tachetée de brun au sommet, très lente à monter.

## 259 LAITUE monte à peine ou Têtue de Nîmes (Cadlère) (graine noire). La meilleure pour l'été, très cultivée dans le Midi, très recommandable.

### 853 LAITUE Palatine.

é très *rustique*, *conservant* longtemps sa pomme.

722 LAITUE grosse blonde têtue (graine blanche).

Laitue assez volumineuse, très lente d monter, convenant très bien pour l'été.

## **257 LAITUE Chou de Naples (Boulone) (graine blanche).** Très grosse, ressemble à *un chou, pomme* très ferme.

### 723 LAITUE géante d'été (de Montluçon) (graine jaune).

Très belle race, donne une pomme volumineuse, très ferme, d'un vert glauque

### 852 LAITUE Gloire de Nantes.

Bonne variété d'été lente à monter.

### 258 LAITUE sans rivale (graine blanche).

neuse, donnant une belle pomme blonde très serrée

724 LAITUE la Préférée (Lorthois ou Trocadéro) (graine noire) Plus lente à monter et plus volumineuse que la Lorthois à graine blanche

262 LAITUE Sucrine (graine blanche). Très belle race, très cultivée dans le Midi, craquante, donnant une Petite pomme très serrée, d'un vert glauque.

725 LAITUE Madrilène (graine noire). Variété convenant très bien aux pays chauds, pomme haute, très serrée.

2137 LAITUE verte grasse.

Variété moyenne donnant beaucoup sur une surface réduite; feuilles épaisses arrondies, vert foncé, pomme serrée, graine noire.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N. 329.

260 LAITUE brune d'hiver (Passion) (graine blanche) .

Bonne variété, teintée de rouge, très résistante au froid et formant sa pomme vite au printemps.

Semer d'août en septembre, repiquer en octobre **ibonne** exposition; préserver des gelées en couvrant pendant l'hiver. Cette variété donne de fin avril jusqu'à ce que les laitues de printemps viennent lui succéder.

### 2076 LAITUE d'hiver de Nansen (L. du Pôle Nord graine blanche). ariété très résistante au froid et se formant une des premières au printe

### 261 LAITUE grosse blonde d'hiver (Bourguignonne) (Lombarde). (graine blanche).

Très productive, variété rustique, pomme grosse un peu lâche.

### 726 LAITUE grosse blonde d'hiver de Sélestat (graine blanche).

Très jolie sorte rustique, pomme volumineuse résistant bien au fro

### 2077 LAITUE Reine des Glaces.

Variété très résistante au froid.

### 727 LAITUE rougette de Montpellier (graine noire).

Variété très rustique, jolie pomme, feuillage roux moucheté de brun.

### 728 LAITUE Passion blonde d'hiver (graine blanche).

Pomme tachetée de rouge, rustique et de qualité excellente. Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 260.

### 334 LAITUE à couper ordinaire (blonde) (graine blanche).

Semer à la volée sur terreau ou en pleine terre bien préparée de février à juillet, éclaircir les plants et les couper au fur et à mesure qu'ils deviennent assez forts; au moyen de semis successifs, on a de la salade tendre toute l'année.

## 2016 LAITUE blonde à couper (améliorée Parisienne). Petite laitue

crêpe, gr. blanche.

Bonne variété se formant très rapidement.

## 335 LAITUE à couper frisée d'Amérique (graine blanche). Feuilles très ondulées, lavées de brun sur les bords.

336 LAITUE à couper frisée feuille de chêne (graine noire). Feuillage vert très découpé, donnant très rapidement des feuilles pouvant se couper sans interruption.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 334.

2017 LAITUE ROMAINE blonde hâtive de Trianon. Variété plus hâtive et de taille plus réduite que la Romaine blonde maraî-

Semer : I° en février-mars sous châssis ou en pépinière bien exposée; repiquer et mettre en place en avril-mai en terre meuble et substantielle. = 2° de mars en juillet en pépinière; repiquer en place en espaçant de 30 cm. environ.

**2139 LAITUE blonde lente à monter.**Tardive blonde, résistant aux chaleurs, graine noire.

### 2018 LAITUE ROMAINE d'Hiver verte de Provence gr. blanche.

Excellente variété d'hiver et de printemps

Semer d'août en septembre, repiquer en octobre à bonne exposition, préserver des gelées en couvrant pendant l'hiver. Cette variété donne de fin avril jusqu'à ce que les laitues de printemps viennent lui succéder.

### 263 LAITUE ROMAINE ballon (Romaine de Bougival) (graine noire) La plus volumineuse, rustique et productive

**2078 LAITUE ROMAINE rouge de Vendée.** *Très volumineuse, résiste bien à la chaleur.* 

729 LAITUE ROMAINE Craquarelle du Midi (Croqueuse) (graine Monte difficilement, passe très bien l'hiver dans le Midi, très estimée sur les marchés du printemps, résiste bien aux chaleurs de l'été. Pour la culture d'hiver semer en Septembre.

## 730 LAITUE ROMAINE pomme en terre (Chicon pomme en terre)

(graine noire).

Petite pomme sur terre, courte, très serrée, très croquante,

**337 LAITUE ROMAINE Chicon Batavia (graine noire).**Race très *vigoureuse*, à pomme. lâche, feuillage ample, roux lavé de brun Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 2017.

2079 LAITUE ROMAINE rouge d'hiver. Variété d pomme haute verte, fortement teintée de brun rouge3:re, résiste au froid et monte lentement.

Semer | Voir Nº 729

**2141 LAITUE en mélange.** *Mélange* de toutes sortes et *de* précocités *différentes*.

Semer | Voir N. 2017.

731 LAVANDE vraie (Lavendula vera). Les feuilles peuvent être employées comme condiment, les fleurs sont très recherchées pour la parfumerie.

Semer de mars en juin en pépinière, repiquer et mettre en place.

Fleurs employées pour la parfumerie.

Hauteur 170 cm.

## 264 MACHE à grosse graine de Hollande (blanche) (Mignonnette)

Race très vigoureuse, feuille large et longue, très recommandée.

Semer de fin juillet jusqu'en octobre, clair, en place à la volée, en cous terrains sains. Tenir le sol légèrement humide pour favoriser la levée. Arroser copieusement pendant les chaleurs.

732 MACHE blonde à coquille vraie.

Feuille en forme de cuillère, cœur bien garni, très productive et de saveur très agréable.

### 340 MACHE verte d'Etampes (à feuilles veinée).

Très rustique, résistant bien au froid, donnant des rosettes bien pleines d feuille glauque veinée.

### 339 MACHE verte de Louviers (à coquille) (maraîchère)

Variété hâtive très productive.

### 341 MACHE blonde d'Italie (à feuille de laitue).

Variété à feuille longue, assez large, d'un joli blond doré.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 264.

### 265 MARJOLAINE ordinaire (Marjolaine à coquille).

Les feuilles sont très employées comme condiment

Semer de mars en mai en pépinière pour repiguer et mettre en place. Le feuilles aromatiques sont employées comme condiment.

### 342 MELON maraîcher d'Avignon.

Fruit sphérique, écorce vert-gris très brodée, choir rouge succulente

Semer : I° sur couche en février-mars et repiquer le plant lorsqu'il a développé 3 ou 4 feuilles. —  $2^\circ$  pour la deuxième saison, on sème en avril-mai; on pourra ouvrir des tranchées de 30 cm. de largeur et les remplir de fumier, repiquer les plants à 60 cm, en tous sens. On se servira indistinctement de cloches ou châssis pour les recouvrir.

## 733 MELON ananas d'Amérique (chair rouge) (orange grimpant) (de

**poche).**Chair sucrée et très parfumée.

2142 MELON Ananas d'Amérique à chair verte.

Diffère de la précédente pur la couleur de la chair vert pâle.

### 734 MELON Boule d'Or (Golden Perfection).

Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 342.

735 MELON de Cavaillon Espagnol ou espanen d'été.
Fruit oblong à écorce brodée, chair rosée excellente, très bonne variété pour la région méridionale, remplace avantageusement le tranché de Cavaillon.

Semer d'avril en mai, repiquer sous châssis ou en pleine terre en les garantissant par des cloches; il est inutile de tailler les branches pour les faire fructifier. Dans le midi de la France, cette variété se cultive en plein champ.

### 856 MELON de Cavaillon tranché à chair rouge.

Excellente variété pour le Midi,

Semer · Voir Nº 735.

### 773 MELON de Cavaillon tranché à chair verte.

Excellente variété pour le Midi.

Semer : Voir Nº 735.

### 774 MELON Olive d'hiver.

Excellente variété d'hiver, chair blanche, de très bonne conservation.

### 343 MELON sucrin de Tours (Caboule).

Fruit rond fortement brodé, chair rouge orangée.

### 344 MELON CANTALOUP d'Alger (Cantaloup de mai). Fruit oblong, écorce ruqueuse, chair très sucré

## **345 MELON CANTALOUP de Bellegarde (de Montauban).** Fruit lisse, chair orangée, sucrée et parfumée.

## 346 MELON CANTALOUP noir des Carmes

Chair rouge, très sucrée, écorce vert noir, très hâtif.

### 737 MELON CANTALOUP obus (Malgache) (Olive). Fruit vert foncé, choir rouge sucrée et très part

### 347 MELON CANTALOUP prescott à fond blanc. Fruit gros d tranches fortement marquées, choir rouge.

### 2144 MELON CANTALOUP délice de la table.

Fruit presque rond, cote d peine marquée, écorce marbrée de plus foncé, chair rouge très parfumée.

### 857 MELON CANTALOUP Parisien.

Amélioration du C. Prescott fond blanc, moins volumineux et d écorce phis mince, chair épaisse et fondante.

### 738 MELON CANTALOUP prescott hâtif à châssis.

Le meilleur pour forcer.

### 348 MELON CANTALOUP Charentais.

Variété donnant d'excellents rendements, cultivés en pleine terre, fruits moyens sphériques, légèrement déprimés, presque lisses, côtes peu marquées, variété très recommandable pour l'expédition.

### 2023 CANTALOUP de Vaucluse ou de Cavaillon amélioré.

Chair rouge, écorce vert gris, employé pour la confiserie et pour l'expédition.
Fruit oblong, très estimé, très sucré.

Pour ces variétés mime mode de culture que pour N° 342.

### 266 MELON d'EAU ou Pastèque à graine noire (à confire).

Fruit oblong, très estimé, très sucré

Semer d'avril en mai, repiquer pleine terre en les garantissant par des cloches; Il est Inutile de tailler les branches pour les faire fructifier dans le midi de la France, cette variété se cultive en plein champ.

### 2085 MOUTARDE DE CHINE.

Semer soit en pots, soit en plein sous chassie. Ces graines sont blanches de la grosseur d'un grain de millet. On en fait un emploi important comme médicament.

### 351 NAVET DE MILAN blanc.

Racine complètement blanche, petit feuillage, variété très hâtive, convenant très bien d la culture sous châssis.

Semer : 1° de janvier à fin mars sur couche tempérée, pour la consommation du printemps. — 2° en mai-juin à une exposition ombragée, pour récolter l'été. — 3° de juillet en septembre, clair, en place à la volée ou en lignes espacées de 25 cm. en bonne terre substantielle, Conserver l'hiver à l'abri du froid.

Le semis fait au début du printemps ne réussit que dans les terrains légers, bien exposés et pouvant être arrosés copieusement.

### 352 NAVET DE MILAN rouge.

Même qualité que le précédent, le collet étant violacé.

Semer · voir N° 35I

## 268 NAVET rond de Croissy (rond des Vertus) (Boule de Neige). Très hâtif, rocine ronde bien blanche.

Se sème en place de mai en août en terre bien fumée et bien préparée. On

peut semer sous châssis à froid, pour la culture forcée, à partir de février. Racine ronde et blanche. En été, afin d'obtenir des racines tendres et douces, on devra arroser assez fréquemment.

### 350 NAVET noir rond.

Racine sphérique, chair blanche, très sucrée.

Semer de juin en septembre à la volée ou en lignes espacées de 25 cm. en terre fraîche et saine.

Consommer à l'automne ou conserver à l'abri du froid pour la provision d'hiver.

### 739 NAVET blanc rond.

Racine extrêmement lisse, de forme arrondie ou légèrement déprimée, se formant vite, d'une netteté parfaite, à feuillage léger, peu abondant.

**740 NAVET rond blanc à collet rose d'hiver.**Sphérique légèrement aplati *résistant bien au froid, racine blanche* d *collet* 

Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 350.

### 741 NAVET à forcer demi-long blanc (de six semaines).

Un ces meilleurs pour lo culture forcée.

Semer : I° de janvier en mars sur couche et sous châssis. -- 2° en maj-juln à une exposition ombragée, pour la consommation de l'été. — 3° de juillet en septembre, clair, en place à la volée ou en lignes espacées de 25 cm., en bonne terre substantielle. Conserver l'hiver à l'abri du froid.

## 2026 NAVET demi-long blanc précoce de Croissy. Variété rustique et de bon rendement.

Semer: voir Nº 741.

## **742 NAVET des Vertus pointu (long de Croissy).** *Très estimé* pour les terres légères et profondes,

Se sème en place de mai en août en terre bien fumée et bien préparée. On peut semer sous châssis à froid, pour la culture forcée, à partir de février. Racine demi-longue et blanche.

743 NAVET Marteau collet rouge.

Même forme que le précédent, collet violacé, race très productive.

## 349 NAVET de Viarmes à collet rose.

Variété d'automne, chair blanche, ferme

**267 NAVET de Meaux (Corne de Cerf).**Forme toupie, peau grisàtre, *choir blanche* et sucrée, *demi-tardif*.

2083 NAVET gris de Morigny.

Très long blanc, très hors terre, excellent pour l'hiver.

744 NAVET demi-long de Péronne. Variété en forme de toupie allongée, à collet rose et très résistante du froid.

### 2084 NAVET iaune de Touraine.

Racine longue jaune, très hors terre, demi-tardive.

**2021 NAVET potager en mélange.** *Mélange des* variétés potagères *rondes et longues.* 

### 272 NAVET de Norfolk à collet vert (Rave à choucroute). Très gros, sphérique, blanc à collet vert, très tardif.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 350.

### 858 NAVET de Norfolk à collet rouge.

Relie racine ronde à collet rouge, tardit

Semer en place de Juillet en août; se cultive comme racine fourragère. Variété recommandée pour les sols peu profonds.

### 2030 NAVET RAVE d'Auvergne tardif.

Tardif, racine ploie

Semer # voir Nº 858.

### 271 NAVET-RAVE du Limousin.

Navet rond sphérique.

Semer ! voir Nº 858.

## 269 NAVET FOURRAGER gros long d'Alsace. Long blanc d collet vert demi-hâtif.

### 270 NAVET FOURRAGER rose de Verdun ou du Palatinat.

Long blanc d collet rose, demi-hâtif

Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 350.

2022 NAVET FOURRAGER en mélange. Mélange des variétés fourragères rondes et longues.

Semer : voir N° 858.

### 273 OIGNON blanc très hâtif à la Reine.

Excellent pour confire.

Semer en pépinière fin août ou commencement de septembre: repiguer Semer en pépinière fin août ou commencement de septembre; repiquer en place en octobre-novembre en terre légère à bonne exposition; couvrir d'une légère couche de paille en hiver pour protéger le plant contre les fortes gelées. Les bulbes de cette variété sont bons à consommer dès le mois d'avril. Les petits oignons à confire s'obtiennent en semant épais dès le printemps pour récolter en été.

### 860 OIGNON blanc très hâtif de Nocéra

Un peu plus gros que l'oignon blanc très hâtif d la Reine.

### 861 OIGNON blanc hâtif de Vaugirard.

Très rustique, collet très fin.

### 2033 OIGNON blanc hâtif de Valence.

### 353 OIGNON blanc gros (blanc de Lisbonne).

Très cultivé dans le Midi pour l'alimentation du marché, lorsqu'il est d peine formé, très doux

## 745 OIGNON blanc gros plat d'Italie (de Pélissanne), Bulbe très large assez hâtif.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N. 273.

### 354 OIGNON jaune de Lescure '(de Tournon) (de Toulouse).

Bulbe assez volumineux d'un jaune cuivré

Semer en place de mars en mai dans une terre bien ameublie et fumée depuis l'automne. On peut également semer sur terreau de mars en avril et repi-quer le plant en mai-juin à une distance de 6 à 8 cm. en tous sens.

## 298 OIGNON jaune piriforme (hâtif) (poire). |olie racine d choir serrée, bulbe allongé.

### 746 OIGNON jaune géant de Zittau ((aune gros du Nord).

Demi-hâtif, bulbe arrondi de bonne conservation

747 OIGNON Jaune géant d'Espagne. Très gros bulbe, se conservant bien : bon surtout pour le Midi.

862 OIGNON jaune de Cambrai.

Variété se rapprochant de l'oignon jaune paille des Vertus, de bonne conservation.

## 748 OIGNON rosé de Bonne Garde (de Mazé).

Très joli bulbe aplati, d enveloppe d'un jaune cuivré, chair rosée, d'une con-servation parfaite.

749 OIGNON rouge vif d'août. Variété hâtive; joli bulbe aplati de bonne consommation en été.

Pour ces variétés mime mode de culture que pour N. 354.

274 OIGNON jaune de Mulhouse (graines).
S'emploie pour faire des semis drus au printemps, pour obtenir de petits bulbes d repiquer l'année suivante.

Semer sur place à la volée ou en rayons en avril-mai en terre bien ameublie et fumée depuis l'automne. La récolte des petits bulbes se fait fin août; ils devront être conservés dans un grenier bien sec et aéré pour être repiqués le printemps suivant.

## **750 OSEILLE blonde de Lyon.**Feuilles larges, amples, d'un joli blond.

Semer de mars en août, clair, en place, en planches ou en lignes espacées de 20 cm. en bon terrain frais et bien travaillé, On peut aussi semer en pépinière et repiguer en place.

## **275 OSEILLE patience ou épinard perpétuel.** *Variété* très *productive*, très *rustique*.

Se sème de mars à Juin en rayons distants de 15 cm. Les plants sont dégarnis de façon à ne laisser que les plus forts distants de 15 cm. environ. On peut également procéder à la culture de l'oseille en divisant les touffes, mais le semis est toujours plus avantageux, car il permet d'obtenir des feuilles plus grandes et d'une végétation plus rapide.

## 276 PANAIS demi-long de Guernesey. Belle race à racine longue et large.

Semer en place de février en juin, éclaircir les plants de 6 à 8 cm. en tous sens. La ....... devra être bien ameublie et surtout bien fumée.

### 277 PE-TSAI amélioré (chou de Chine).

Belle plante d feuillage d'un blond doré, se consommant crue, en salade ou

Semer : I° En août-septembre en pépinière; repiquer de même et mettre en place préférablement en automne ou au printemps, en bonne terre bien fumée, en espaçant de 40 cm. environ.— 2° En février-mars sur couche et sous châssis; mettre en place en mars-avril.— 3° De mars en juin en pépinière; repiquer et mettre en place dès que les plants auront quatre ou cinq feuilles.

### 2039 PERSIL frisé vert foncé.

Feuillage frisé servant d orner les plats.

Semer depuis février jusqu'à septembre sur place en bordures, en planches ou en rayons. En été, pendant les chaleurs, donner quelques arrosages pour éylter un arrêt de végétation.

863 PERSIL à grosse racine, long, sucré. Racine d chair blanche, comestible, de saveur sucrée

Semer : Voir n° 2039.

### 355 PIMENT de Cavenne long étroit (rouge) (long piquant).

Fruit long, très étroit et de saveur très piquan

Semer : I° En février-mars sur couche; repiquer sur couche ou sur châssis à froid; mettre en place en mai à exposition chaude en bon terrain fumé, en espaçant de 40 cm. environ. La culture en pots réussit très bien et permet de récolter en serre une partie de l'hiver.

Semer : Voir Nº 355

279 PIMENT doux d'Espagne (Piment vert) (Poivron).

Variété productive fruit long, large, cylindrique et très doux.

Semer : Voir Nº 355.

### 64 PIMPRENELLE petite (à salade).

Semer en place au printemps ou à la fin de l'été. Ne pas laisser fleurir pour avoir de meilleures feuilles.

775 PISSENLIT vert de Montmagny amélioré. Race très vigoureuse se prêtant très bien au blanchiment.

Semer tout le printemps en pépinière et repiquer en place. On sème aussi. clair, en place, en planches ou en rayons. Pour obtenir des feuilles blanches l'hiver, recouvrir les plantes de fumier, terreau, paillassons, etc.

**280 PISSENLIT ordinaire (dent de Lion).**On peut le faire blanchir comme la barbe de capucin.

Semer: Voir Nº 775.

865 POIREAU gros long d'été ou de Nimes. Sorte convenant parfaitement au climat méridional, pied long et assez gros.

Semer sur couche de Janvier en février et en pleine terre en mars-avril; repiquer en place de mai en juillet, en lignes distantes de 20 cm. Le poireau se plaît en terre fraîche et bien fumée.

282 POIREAU très gros de Rouen (Poireau de printemps). Variété très rustique, supportant bien l'hiver : pied court.

### 2151 POIREAU gros court du Brabant.

Pied court assez gros, feuillage dressé en éventail, très résistant d la sécheresse comme aux grands froids.

752 POIREAU long de Mézières.
Race supportant très bien les froids, pied long et gros.

297 POIREAU jaune du Poitou (très gras).
Variété très hâtive, se formant rapidement, pied court très gros, feuillage franchement jaune.

### 281 POIREAU très long d'hiver de Paris.

Pied très long et mince, très blanc, résistant bien d l'hiver.

753 POIREAU de Musselbourg. Variété d pied haut, épais et d larges feuilles.

356 POIREAU monstrueux d'Elbeuf (tête d'Anguille).

Très jolie variété, la plus hâtive d se former, pied assez long et gros, sorte la plus productive, très recommandée.

### 2040 POIREAU Eléphant.

Variété très précoce d très gros pied court supportant bien le froid.

Pour ces variétés mime mode de culture que pour N° 865.

### 283 POIRÉE à couper verte (Bette épinard) (fines herbes).

On consomme les feuilles comme celles des épinards

Semer en pleine terre d'avril à mai, repiquer le plant en terre bien défoncée à 50 cm. de distance

## 2041 POIRÉE blonde à couper. Même emploi que la précédente

866 POIRÉE blonde frisée Lucullus.

Carde de largeur moyenne, peut être employée comme poirée d carde et comme poirée d couper.

284 POIRÉE verte à carde blanche (Bette). Variété très rustique, d très large corde blanche bien pleine, feuillage vert

Pour ces variétés même mode de culture que pour N. 283.

## 285 POTIRON jaune gros de Paris (Courge Romaine Jaune). Très gros, chair jaune sucrée, se conservant bien.

Semer I I° En mars-avril sur couche; repiquer sur couche en potées de 2 ou 3 plants, mettre en place en avril-mai.— 2º En fin avril-mai en place, par capots de 5 à 6 graines espacés de 2 mètres. Conserver l'hiver à l'abri du froid.

### 754 POTIRON gros vert d'Espagne.

Fruit moyen aplati, légèrement brodé, chair rouge orange succulente de bonne

### 755 POTIRON gris de Boulogne.

r jaune, côtes légèrement marquées.

## 2154 POTIRONS en mélange. Mélange des sortes ci-dessus.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 285.

### 286 POURPIER doré à large feuille.

euille plus large que dans le Pourpier vert, d'un beau jaune doré, saveur

Semer en place sur couche en mars-avril ou en pleine terre dans un sol meuble et léger de mai en août, éclaircir les plants en les espaçant de 10 à 12 cm. en

### 70 POURPIER vert,

Semer en place sur couche en mars-avril ou en pleine terre dans un sol uble et léger de mai à août ; éclaircir les plants en les espaçant de loà 12 cent, en tout sens.

### 2155 RADIS à forcer rond rose hâtif.

Racine ronde, aplatie, rose carmin, petit feuillage

## 357 RADIS rond écarlate très hâtif (à chassis) (à forcer). Jolie racine arrondie se formant très vite à feuillage très fin.

Semer: I° Da décembre en février sur couche près du verre. — 2° Fin févriermars sur couche libre ou à bonne exposition en garantissant du froid. —
3° Tout le printemps et l'été, clair, en place, en bonne terre fraîche. — 4° Fin septembre à bonne exposition en abritant du froid.

### 2156 RADIS à forcer rond rose à bout blanc.

Jolie racine arrondie se formant très vite d feuillage très fin.

2158 RADIS à forcer Gaudry.
Radis rond se formant rapidement, de grosseur moyenne; écarlate vif à grand bout blanc, convient également pour la pleine terre.

756 RADIS à forcer rond blanc petit hâtif.

Petite racine ronde d'un blanc transparent €1 de saveur piquante.

777 RADIS à forcer demi-long rose à bout blanc.
Racine demi-longue très hâtive, feuillage fin.

### 778 RADIS à forcer demi-long écarlate.

Racine 00010e allongée, feuillage peu développé.

### 759 RADIS à forcer demi-long écarlate à bout blanc.

Racine demi-longue d'un rouge très vif, bout blanc bien marqué, feuillage

Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 357.

757 RADIS rond rose saumoné. Variété s'accommodant très bien en pleine terre.

Semer tout le printemps et l'été en place, en bonne terre tenue fraîche pendant les chaleurs. On peut aussi semer fin septembre à bonne exposition en

358 RADIS rond écarlate hâtif.

Variété très précoce, petit feuillage, racine ronde.

## 1 00 RADIS rond écarlate à grand bout blanc. Racine ronde, bout blanc très prononcé.

## 2159 RADIS de Sézanne rond rose à grand bout blanc. Racine aplatie rose vif d très grand bout blanc, convient pour les semis d'été,

long d se creuser.

## 867 RADIS demi-long rose à bout blanc (race du Midi). Race d bout blanc très prononcé.

## 779 RADIS demi-long écarlate à bout blanc.

Racine demi-longue, d'un rouge très vif d petit bout blanc bien marqué.

### 359 RADIS demi-long écarlate hâtif forme allongée.

Même qualité que le radis demi-long écarlate forme olive, racine plus allongée presque pointue.

### 760 RADIS demi-long écarlate hâtif forme olive.

Jolie racine ovoïde, rappelant la forme d'une olive, d'un rouge très vif, variété très rustique venant bien en pleine terre.

## 868 RADIS jaune d'été (Radis roux d'été). Variété hâtive d racine moyenne sphérique, chair piquante.

Pour ces variétés même mode de culture que pour Nº 757.

### 287 RADIS blanc rond d'été (Ramola) (Rabota plat).

lolie racine d'un blanc neige, saveur as:

Semer en place et successivement d'avril à septembre en pleine terre bien préparée et fumée. Arrosages fréquents et abondants. Racines de saveur particulièrement piquante.

### 2081 RADIS aris rond d'été.

Racine légèrement en forme de toupie, chair blanche très piquante.

## 780 RADIS demi-long blanc de Strasbourg (Radis de l'Hôpital). Variété très productive, racine demi-longue.

Semer en place ou à la volée depuis la fin de mars jusqu'au mois d'août en terre bien préparée et fumée. Arrosages fréquents et abondants

### 360 RADIS de Stuttgart ou blanc géant d'été.

Racine, très volumineuse se formant assez vite.

Semer : Voir Nº 780

## 290 RADIS-RAVE blanche de mai (de Vienne) (longue blanche de

Belle racine blanche, chair très appréciée.

### 761 RADIS-RAVE blanche transparente (glaçon).

Racine longue d'un bout blanc de glace

Semer I Voir Nº 780.

289 RADIS rose de Chine (d'hiver) (Radis navet).
Racine d'un joli rose, de forme cylindrique d bout renflé.

Semer en place en pleine terre bien préparée et fumée, de juin en août; arrosages fréquents pendant les chaleurs pour obtenir des radis très tendres.

758 RADIS d'automne noir rond. Belle et grosse racine à peau noire et d chair blanche très piquante.

Semer | Voir Nº 289.

288 RADIS violet de Gournay (d'hiver), Même forme que le radis noir long, mais violacé, saveur plus douce.

Semer | Voir Nº 289.

**361 RADIS blanc d'Augsbourg (d'hiver).**Racine très grosse à *large* collet *demi-longue, chair* très *serrée et très* piquante Semer : Voir Nº 289.

## 362 RAIFORT champêtre de l'Ardèche (amélioré repiqué). Grosse racine longue d collet violet.

Semer en juin-juillet. Réussit bien dans les sols médiocres. Grosses racines utilisées comme fourrage, à l'instar des navets.

Plante ornementale par le grand développement de ses feuilles, on emploie les pét o les arge et épais pour le confection de confitures.

Semer d'avril en mai, en pots, terrines ou en pépinière, repiquer de même et mettre en place de préférence dès l'automne ou au printemps par capots espacés de 1 mètre.

### 364 SALSIFIS Nammouth.

Variété très productive, donnant une racine plus grosse et plus lisse que le salsifis blanc.

Semer de fin février à fin avril en place, à la volée ou en lignes espacées de 25 cm. environ, en bonne terre bien défoncée et convenablement fumée. Arroser pour faciliter la germination assez capricieuse, de même pendant les fortes chaleurs.

## 2043 SALSIFIS à très grosse racine Mammouth. S. Sandwitch Island. Grosse racine lisse très allongée.

Semer | Voir Nº 364.

**365 SCOLYME d'Espagne ou salsifis chardon.**On consomme les racines à la façon des salsifis, goût ires agréable et fin. Semer sur place au printemps, en rayons distants de 10 à 20 cm. pour faciliter les binages. Racines longues se mangeant à l'instar du salsifis.

366 SCORSONÈRE géante de Russie.
Les racines longues, bien cylindriques plus grosses que la scorsonère, sont bien lisses et très tendres.

Semer de fin février à fin avril en place, à la volée ou en lignes espacées de 25 cm. environ, en bonne terre bien défoncée et convenablement fumée. Arroser pour faciliter la germination assez capricieuse, de même pendant les fortes chaleurs

2163 THYM d'hiver.
Plante plus haute et d feuille plus large que le Thym ordinaire.

Semer en pleine terre à bonne exposition et mettre en place de juin en août à 15 cm. de distance. Convient pour faire de solides bordures aux jardins potagers.

292 TOMATE rouge grosse.

Variété à fruit côtelé très gros, très productive.

Semer sur couches de mars en avril, repiquer également sur couche un mois après le semis et mettre en place à exposition chaude à partir de la dernière quinzaine de mai en espaçant les pieds de 30 à 35 cm.

## 293 TOMATE Trophy rouge grosse lisse. Vigoureuse et rustique, fruit lisse arrondi.

**294 TOMATE Pierrette.**Très précoce et de *grand rapport, fruit* rouge *vif volumineux et de bonne* qualité.

## **2044 TOMATE Chemin rouge hâtive.** *Fruits sphériques, charnus, réunis en* grappes.

## 367 TOMATE Mikado écarlate. Fruit très gros, lisse, rouge, écarlate brillant.

**369 TOMATE Roi Humbert.**Fruit rouge écarlate, assez beau, oblong, de longue conservation.

295 TOMATE des Alliés (en grappe). Fruit lisse, très productif très résistant d la maladie.

### 368 TOMATE de Marmande.

été recommandée pour sa résistance aux maladies, fruit gros très peu

côtelé.

2048 TOMATE perfection.

Tient son nom de toutes les qualités qu'elle réunit pour les marchés

Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 292.



### 705 LAWN-GRAS pour pelouses.

Mélange résistant d 🕼 sécheresse, convenant particulièrement pour

Semer au printemps fin mars à fin mai, en terre très travaillée. Rouler ou tasser le semis. Mettre si possible une légère couche de terreau. Arroser légèrement deux fois par jour jusqu'à la levée complète.

### 706 RAY-GRASS pour gazons.

A grands rendements pour terrains fertiles, la végétation est très

Semer au printemps fin mars à fin mai en terre très travaillée. Rouler ou tasser le semis. Mettre si possible une légère couche de terreau. Arroser légèrement deux fois par jour jusqu'à la levée complète.

### 707 MÉLANGE tour lapins.

e composé de carotte fourragère, chicorée pour lapin, trèfle, etc. constitue un excellent mélange pour la nourriture des lapins

Semer de février à septembre à la volée ou en lignes distantes, de 30 cm. Recouvrir les graines de 2 cm. de terre fine et donner de fréquents arrosages pour activer la levée. Récolte même année ou la suivante si le semis a été . fait après juillet.

### 709 GAZON rustique.

Mélange de graminées judicieusement choisies dont on obtiendra toujours un gazon fin, bien fourni et de longue durée.

Semer au printemps, fin mars à fin mai, en terre très travaillée. Rouler ou tasser le semis. Mettre si possible une légère couche de terreau. Arroser légèrement deux fois par jour jusqu'à la levée complète.

### 447 AGERATUM du Mexique grand bleu.

Fleur extrêmement robuste. Très harmonieuse dans les plates-bandes et d'un joli effet dans les bouquets.

Semer : I° En mars-avril sur couche; repiquer de même et mettre en place en mai, à bonne exposition en espaçant de 30 à 40 cm. - 2° En avril-mai en pépinière au midi, mettre en place en mai-juin.

### 448 AGERATUM du Mexique nain bleu.

Fleur extrêmement robuste. Très harmonieuse dons les plates-bandes et d'un joli effet dans les bouquets.

Semer: Voir Nº 447.

### 449 AGERATUM du Mexique nain varié.

Fleur extrêmement robuste. Très harmonieuse dans les plates-bandes et d'un joli effet dans les bouquets.

Semer I voir Nº 447.

400 ALYSSE Corbeille d'Or.

Fleurs très nombreuses, précieuses pour bordures et mosaïculture.

Semer de mars en juin; repiquer à l'automne en terre sèche ou rocailleuse. Haut. 20 cm. F. (jaune d'or) en avril, la deuxième année

**401 AMARANTE crête de coq grande variété.**Plante de forme bizarre, d'un coloris riche et velouté.

Semer en mars-avril sur couche, repiquer de même et mettre en place en mai-juin à bonne exposition, en terrain léger et bien fumé, en espaçant de 35 à 40 cm. Hauteur environ 40 cm. FI. de juin à septembre.

### 450 AMARANTE crête de coq naine variée.

Plante de forme bizarre, d'un coloris riche et velouté.

Semer en mars-avril sur couche, repiquer de même et mettre en place en mai-juin à bonne exposition, en terrain léger et bien fumé. en espaçant de 35 à 40 cm.

### 402 AMARANTE queue de Renard.

Semer en mars-avril sur couche; repiquer sur couche et mettre en place en bonne terre à bonne exposition en mai-juin. Convient pour plante isolément ou en massifs. Fleurs en longues panicules retombantes d'un effet très original. Haut. 0 m. 70 à I m. FI. de juin en octobre.

### 929 ANCOLIE hybride de Cœrulea variée.

Race très rustique à fleurs nombreuses capuchonnées.

Semer de mars à juin, un- peu à l'ombre, repiquer en pépinière, mettre en place à l'automne et au printemps.

**453 ASPARAGUS** plumosus nanus.

Très jolie plante pour jardins d'hiver et décoration d'appartements.

Semer sous verre en février-mars, repiquer sous châssis en avril-mal.

### 454 ASPARAGUS Sprengeri.

Espèce vigoureuse, précieuse pour suspensions.

Semer de janvier en avril en serre ou sur couche, en pots ou en terrines bien drainées; repiquer en godets sur couche; mettre en place fin mai-juin à miombre.

### 900 ASTER vivace à grande fleur variée.

Très belle plante recherchée pour plates-bandes, corbeilles et fleurs coupé

Semer de bonne heure en place ou sur couches à la fin de l'hiver; fleurira la même année en octobre-novembre.

### 901 AUBRIETIA deltoidea.

Petite plante rustique pour bordures et jardins en rocailles, convient pour toutes expositions.

Semer sous châssis en octobre-novembre; repiguer en janvier pour floraison avril à juin. Très rustique.

### 902 BALSAMINE Camélia (extra-double) variée.

Espèce vigoureuse et magnifique, très florifère d fleurs régulières larges et pleines.

Semer en avril sur couche ou au commencement de mai en pépinière, repiquer de même, mettre en place de mai en juin à toutes expositions, mais découverte à l'ombre.

### 403 BÉGONIA semperflorens varié.

Très jolie fleur, particulièrement employée pour corbeilles et bordures situées à l'ombre, vient également très bien en terrines ou en pots.

Semer de février en mai, en couvrant peu les graines, en terrines, en serre ou sur couche; repiquer de même puis en pots; mettre en place de juin en juillet, à mi-ombre, en terre légère et substantielle. Arracher les tubercules à l'au-tomne et planter en avril-mai. Haut. environ 40 cm. FI. de juillet en octobre.

### 930 BELLE DE JOUR à grande fleur Unicaulis.

Fleurs très rustiques ne réclamant que peu de soins, servant d orner très agréablement les corbeilles et les plates-bandes.

Semer de mars en mai sur couche, repiquer en juin; on peut semer en place en mai-juin.

### 455 BENOITE à grande fleur double variée.

Plante élégante vigoureuse et très florifère, convient pour terrains légers et demande une exposition ombragée.

Semer d'avril à juin, en pépinière demi-ombragée et en terre sableuse. Repiquer en pépinière et mettre en place à l'automne à 30 ou 40 cm. de distance.

### 903 CAMPANULE à grosse fleur double variée.

Plante robuste venant en tous terrains et résistant bien à la sécheresse.

Semer d'avril en juin en recouvrant peu les graines, en pépinière mi-ombragée; repiquer de même, mettre en place dés l'automne de préférence ou au printemps, en tous terrains sains et à toutes expositions bien aérées.

### 1006 CAMPANULE à grosse fleur double blanche.

Semer ! Voir Nº 903.

### 404 CANNA (balisier) en mélange.

Plante remarquable par sa tenue et la richesse del a floraison.

Semer : I° De février en avril, en terrines sur couche chaude; repiquer sur couche, de préférence en pots; mettre en place fin mai et juin; fleurit à  $l^{\dagger}au$ tomne de la même année. — 2° Fin mai-juin, en pépinière bien exposée; repiquer en pépinière au midi; relever ou mettre en pots avant l'arrivée des froids; pour hiverner en serre, orangerie, bâche, châssis ou cave. Hauteur variant de 60 cm. à I m. 50.

### 496 CAPUCINE nouvelle hybride à fleur double (Double-hybride Nasturtiums Sweet-Scented).

Les Capucines grimpantes ou naines sont parmi les plus robustes et s'accom-modent de tous terrains ; suivant les variétés elles constituent un très bel ornement pour les treillages, fenêtres, balcons. Les Capucines naines per-mettent d'heureux mélanges en bordures ou en corbeilles.

Semer :  $1^{\circ}$  En mars-avril sur couche ou en pépinière bien exposée et abritée; repiquer de même en pots; mettre en place en mai. —  $2^{\circ}$  En avril-mai sur place, à bonne exposition.

### 1038 CAPUCINE naine Impératrice des Indes.

Feuillage vert teinté de brun. Fleurs rouge éclatant.

Semer: 1º En mars-avril sur couche ou en pépinière bien exposée et abritée; repiquer de même en pots; mettre en place en mai. - 2° En avril-juillet sur place, à bonne exposition.

### 932 CAPUCINE grande brune d'Alger.

Les Capucines grimpantes ou naines sont parmi les plus robustes et s'accom-modent de tous terrains ; suivant les variétés elles constituent un très bel ornement pour les treillages, fenêtres, balcons. Les Capucines naines per-mettent d'heureux mélanges en bordures ou en corbeilles.

Semer: Voir Na 496.

933 CAPUCINE hybride de Lobb variée. Les Capucines grimpantes ou naines sont parmi les plus robustes et s'accommodent de tous terrains; suivant les variétés elles constituent un très bel ornement pour les treillages, fenêtres balcons. Les Capucines naines permettent d'heureux mélanges en bordures ou en corbeilles

Semer: Voir Nº 496

II 6 CENTAURÉE ambrette variée (Musquée).

Plante très robuste ne nécessitant que peu de soins; très utilisée pour fleurs

Semer en place de mars en mai, ou de septembre en octobre; repiquer le semis d'automne en pépinière à bonne exposition pour passer l'hiver; mettre en place en mars.

904 CENTAURÉE barbeau (bleuet) bleue.

Plante très robuste et ne nécessitant que peu de soins; très utilisée pour fleurs couper.

Semer : Voir Nº I 16.

405 CHOUX frisés et panachés variés. Plantes remarquables par leur feuillage curieusement découpé et la gronde variété de leur panachure. Très appréciées pour culture de pleine terre ou pour potées.

Semer en mars-avril en pépinière, procéder au repiquage en mai, pour mettre définitivement en place dans le courant de l'été. Quand les gelées ont passé sur ces plantes, la teinte uniforme des feuilles se modifie; on obtient ainsi des panachures de rouge, de vert et de lilas. Ces choux, résistant bien aux froids, servent à composer l'hiver des massifs et des corbeilles agréables à l'œil.

### 906 CHRYSANTHÈME des Jardins double blanc.

Vigoureuse plante florifère poussant très facilement dans tous les terrains.

Semer : Iº En mars-avril sur couche ou en pépinière à bonne exposition, repiquer de même et mettre en place en mai. — 2° Sur place d'avril en mai. On peut aussi semer *en* septembre, repiquer et hiverner sous châssis, mettre en place en avril.

907 CHRYSANTHÈME à carène blanc. Vigoureuse plante florifère poussant très facilement dans tous tes terrains.

Semer : Voir N° 906.

406 CINÉRAIRE hybride à grande fleur variée.

Plante à floraison abondante très recherchée pour l'ornementation des jardins

Semer de juin en août en terrine bien drainée et remplie de terre légère et sablonneuse et en recouvrant très peu la graine. Quand les plants ont trois ou quatre feuilles, les repiquer en terrine ou séparément en godets, rempoter au fur et à mesure des besoins et hiverner sous châssis ou en serre presque froide. On peut également les repiquer en pleine terre sous châssis et rempoter à l'automne; on obtient ainsi *une* végétation plus vigoureuse. Haut. SO à 60 cm.

407 CINÉRAIRE maritime (feuillage argenté). Feuillage argenté, utilisé pour faire des bordures dans les parterres français.

Semer en mai-juin en pleine terre; repiquer en **pots pour** hiverner sous châssis; mettre en place au printemps à 40 cm. de distance. Feuillage argenté et cotonneux. Hauteur 40 à 60 cm.

### 408 COBÉE grimpante.

Une des plus jolies plantes grimpantes pour décorer les balcons et les fenêtres.

Semer de fin janvier en avril sur couche; repiquer de même et mettre en place en mai-juin, à toutes expositions, mais préférablement au nord ou à l'est

Haut. 6 à 8 cm. FI. de juillet en octobre.

445 COLEUS en mélange premier choix.

Plante ornementale à feuillage curieusement maculé.

Semer sur couche ou en serre en mars-avril; repiguer en pots et laisser sur couche; mettre en place en mai-juin. Feuillage ornemental pour décoration de massifs. corbeilles, etc.

934 COLLINSIA bicolore.

Plante à fleurs très abondantes employée spécialement pour corbeilles et hordure

Semer « I° De mars en mai sur place, ou bien en pépinière, et repiquer en place fin mai.—  $2^\circ$  Fin septembre-octobre en pépinière bien exposée, repiquer de même, abriter des grands froids et mettre en place au printemps.

409 COLOQUINTES en mélange.
Plante grimpante de culture facile convenant pour treillages et berceaux, donnant des fruits de forme curieuse et de coloris bizarre.

Semer : I° En mars-avril en potées, sur couche ou en pépinière bien exposée; mettre en place en mai. — 2° En mai sur place, à bonne exposition, en espaçant de I mètre environ.

Haut. 2 à 3 métres et plus.

### 936 COQUELICOT à grande fleur simple Perfection variée

Plante rustique s'accommodant de tous terrains et donnant des fleurs h coloris très variés.

Semer de février jusqu'à mai ou en septembre-octobre sur place ou en pots qu'on met ensuite en place sans diviser la motte.

### 410 COSMOS hybride hâtif à grande fleur variée.

Plante haute d feuillage gracieusement découpé, très employée pour les massifs ou plates-bandes : convient également pour fleurs coupées.

Semer ; 1º De février en mars sur couche; repiquer en pépinière à bonne exposition ou en place. — 2º Fin avril, en pépinière bien exposée; repiquer en place en mai-juin.
Haut. I m. 20 Fl. de juin en octobre.

### 1069 COSMOS hybride hâtif à grande fleur blanche.

Plante haute à feuillage gracieusement découpé, très employé pour les massifs ou plates-bandes ; convient également pour fleurs coupées.

### 068 COSMOS hybride hâtif à grande fleur cramoisie.

Semer | Voir Nº 410.

### 1066 COSMOS hybride hâtif à grande fleur rose.

Semer: Voir N. 410.

908 COURGES en mélange (variété d'ornement).

Plante haute très employée pour treillages. Donne des fruits de forme excessivement bizarre.

Semer en mars-avril sur couche, repiguer ensuite les plants en godets sous châssis. La mise en place a lieu courant mai à bonne exposition, lorsque les gelées ne sont plus à craindre.

411 CYCLAMEN de Perse à grande fleur variée.
Gronde fleur d'une rare beauté très appréciée pour serres, jardins d'hiver et appartements.

Vivace en serre ou orangerie. — Primulacées. Semer : I^o En juillet-août en terre de bruyère, en terrines ou en pots placés à l'ombre; hiverner sous châssis ou en serre; repiquer au printemps et cultiver en pots de préférence.  $-2^{\circ}$  de janvier en mars sur couche pour repiquer en

pots en mai-juin. Haut. environ 20 cm. Fl. de novembre en avril.

412 DAHLIA simple à fleur géante variée. Espèce aussi riche par ses formes harmonieuses que par ses coloris variés; fleurit abondamment d'août d octobre.

Semer en mars-avril sur couche, ou en mai, en pépinière, à exposition chaude; repiquer en pépinière et mettre en place en mai-juin. En hivernant les racines en lieu sain on peut conserver les plantes indéfiniment. Haut. Ià 2 mètres. Fl. d'août à novembre.

### 937 DAHLIA décoratif double géant varié.

Espèce aussi riche par ses formes harmonieuses que par ses coloris variés fleurit abondamment d'août d octobre.

Semer: Voir Nº 412.

938 DAHLIA cactus double en mélange.

Espèce aussi riche par ses formes harmonieuses que par ses coloris variés: fleurit abondamment d'août à octobre.

Semer: Voir Nº 412.

939 DATURA d'Egypte double blanc.

Plante curieuse et très jolie à grandes fleurs, d'un très bel effet, pour parterres.

Semer en mars-avril sur couche, repiquer de même en godets ou en pépinière bien exposée, mais en garantissant du soleil les premiers jours; mettre en place en mai. On peut aussi semer fin avril-mai sur place, en lieu chaud.

### 039 ECCRÉMOCARPE grimpant varié.

Plante grimpante s'élevant jusqu'à S mètres. Fleurs en grappes rouge orange.

Semer de juin en août en terrines en terre de bruyère, repiquer les jeunes plants pour être hivernés sous châssis ou en serre tempérée, mettre en place en avril à 75 cent. de distance. On peut semer en mars et repiquer sur couche en godets pour mettre en place en mai. Fl. rouge orange brillant. Haut. 4 à 5 m.

940 GAILLARDE peinte à fleur double variée.

Plante annuelle remarquable par l'éclat et la richesse de so floraison. Très employée pour plates-bandes et corbeilles ainsi que pour fleurs coupées.

En mars-avril sur couche, ou en avril-mai en pépinière abritée; repiquer de mime et mettre en place en mai.  $-2^{\circ}$  En août-septembre en pépinière, repiquer en pots, hiverner sous châssis, mettre en place au prin-

**433 GÉRANIUM (Pelargonium zonale).**Plante remarquable, aux fleurs d'un coloris distingué, convient pour serres et potées.

Semer d'avril en juillet, en terrain léger ou sableux, repiquer en pépinière et mettre en place en automne ou au printemps.

1 **040 GERBERA hybride variée.**Plante vivace à cultiver dux expositions les plus chaudes. Fleurs d couper.

Semer d'avril en septembre en pots bien drainés, terre franche, terreau, sable par tiers, la graine verticale, le plumet en l'air, à ras de terre.

### 458 GIROFLÉE QUARANTAINE à grande fleur double blanche.

Plante convenant pour plates-bandes, massifs, potées et fleurs coupées

Semer : I° En **février-mars** sous châssis ou sur couche; repiquer en pots **0u** en pépinière à bonne exposition, mettre en place en mai. — 2° En avril-mai sur place ou en pépinière pour planter à demeure en juin.

### 910 GIROFLÉE GROSSE ESPÈCE Cocardeau variée.

Plantes aux fleurs de coloris très variés convenant pour plates-bandes, massifs, potées et fleurs coupées.

Semer de mai en juin; repiquer les jeunes plants et 3 semaines après les trans-planter dans une terre bien préparée en lignes espacées de 25 à 30 cm., arroser fréquemment pendant l'été; en octobre on enlève les plants que l'on

### 459 GIROFLÉE D'HIVER de Nice remontante à grande fleur hâtive blanche.

Plantes convenant pour plates-bandes, massifs, potées et fleurs coupées.

Semer de mai en juin, en pépinière, repiquer une ou deux fois en pépinière; puis relever à la fin de l'été jusqu'en septembre-octobre, pour mettre en pots qu'on hivernera sous chassis, ou en serre; planter à demeure au printemps ou laisser fleurir en pots.

Haut, 50 à 60 cm. FI. d'avril en août.

## 413 GIROFLÉE D'HIVER de Nice remontante à grande fleur hâtive

Plante aux fleurs; de coloris très variés convenant pour plates-bandes, massifs, potées \_et fleurs coupées.

Semer: Voir N° 459.

**434 GIROFLÉE JAUNE Ravenelle double variée.**Giro fiées bisannuelles convenant pour massifs et potées. Egolement très recherchées pour fleurs coupées.

Semer de mal à juillet et repiquer à l'automne en distançant les plantes de

40 à 50 cm. La floraison a lieu dans le courant de l'année suivante.

### 1041 GLAIEULS variés.

onne plante pour fleur coupée

Semer de mars en mai en pépinière sous châssis ou à bonne exposition; arracher les petits bulbes en novembre, hiverner en lieu sain pour planter en pépinière au printemps : mettre *en* place l'année suivante.

460 GODETIA Rubiconda splendens. Plante de culture extrêmement facile et de végétation rapide : se couvre d'une multitude de grandes fleurs à reflets chatoyants.

Semer en place de mars en mai ou en pépinière, planter en juin. On sème aussi en septembre pour repiquer en pépinière en octobre à bonne exposition.

### 435 GYPSOPHILE élégant à grandefleur mauve rosé.

Plante donnant des ramifications nombreuses et fines. Recherchée surtout pour la confection des bouquets.

Semer en place d'avril en mai. On sème aussi en septembre. Repiquer les

plants avant l'hiver, à bonne exposition.
Plante recommandable pour ta confection des bouquets.

911 GYPSOPHILE paniculé (vivace).

Plante donnant des ramifications nombreuses et fines. Recherchée surtout pour la confection des bouquets.

Semer en place d'avril en mai. On sème aussi en septembre. Repiquer les

plants avant l'hiver, à bonne exposition. Plante recommandable pour la confection des bouquets.

**461 HARICOT d'Espagne blanc.**Plante de végétation rapide convenant particulièrement pour l'ornementation des treillages, berceaux et balcons.

Semer  ${\mathbb I}$  1° En mars-avril en pots, sous châssis froid ou en orangerie, mettre en place en mai sans diviser. — 2° De fin avril en mai-juin, de préférence en

**414 HARICOT d'Espagne varié.**Plante de végétation rapide convenant particulièrement pour l'ornementation des treillages, berceaux et balcons.

Semer: Voir Nº 461.

### 415 HÉLIOTROPE varié.

Plante ornementale des plus précieuses, d fleurs très parfumées et du plus bel effet.

Semer en mars-avril sur couche; planter en mai en bonne terre. Se sème aussi de juin en août; repiquer en pots, hiverner sous châssis. Haut. 40 à 50 cm. FI. de juillet en octobre.

### 436 HELLEBORE (Rose de Noël).

Très belle fleur d'hiver d feuillage persistant.

Semer en septembre-octobre ou de mars en mai en pépinière, à mi-ombre; repiquer en pépinière; mettre en place à mi-ombre, en automne, de préférence, ou au printemps.

Haut. 20 à 30 cm.

## **416 HOUBLON du japon à feuille panachée.**Plante grimpante, robuste, très intéressante pour la garniture des treillages

et des tonnelles.

Semer en février-mars sur couche; repiquer en godets et mettre en place en mai. Plante précieuse du plus bel effet pour garnir les tonnelles, treillages, etc. haut. 6 à 8 métres.

**462 IMMORTELLE annuelle double blanche (Xeranthemum).**Plante très employée pour la décoration des jardins d'été. Les fleurs séchées d l'ombre se conservent indéfiniment.

Semer de mars en mai en place, ou en pépinière pour repiquer de même et mettre à demeure en mai-juin. Semer aussi fin septembre-octobre en pépinière; repiquer de même abriter des grands froids et mettre en place au printemps.

463 IMMORTELLE à bractées doubles blanche (Helichrysum), Plante très employée pour la décoration des jardins d'été. Les fleurs séchées à l'ombre se conservent indéfiniment.

Semer en septembre-octobre en place ou en pépinière pour repiquer à l'automne ou au printemps. Floraison au printemps. On peut aussi semer de février à avril en place ou en pépinière, pour obtenir une floraison en été.

### 1042 IMPATIENS Sultani hybride.

Plante de serre tempérée et de pleine terre pendant la belle saison. Floraison de très longue durée se prolongeant pendant l'hiver pour les sujets placés en

Semer en terrines ou sur couche chaude de mars en avril, repiquer sur couche; lorsque le planta 2 ou 3 feuilles, repiquer en godets et mettre définitivement en place en mai-juin en bonne terre bien fumée.

**464 JULIENNE DE MAHON blanche (Mignonnette).**Plante particulièrement précieuse par la rapidité de son développement et son aptitude à végéter en toutes conditions.

Semer d'avril à juin en place. La floraison a lieu tout l'été.

### 942 JULIENNE DES JARDINS simple variée

Plante particulièrement précieuse par lo rapidité de son développement et son aptitude d végéter en toutes conditions.

Semer sur place d'avril en mai. On sème aussi en septembre en place à bonne exposition; repiquer les plants en mars-avril. Bonne plante pour bordures

### 1026 KOCHIA trichophylla.

Plante annuelle ayant l'apparence d'un arbuste taillé en forme d'œuf, feuillage devenant rouge d l'automne.

Semer 1° En mars-avril sur couche, repiquer de même et mettre en place en mai. - 2° En avril-mai en place ou en pépinière.

### 912 LIN vivace bleu.

Plante à fleurs d'un coloris éclatant. Convenant pour corbeilles et bordures. Semer en place en avril-mai. On peut semer en pépinière en avril et repiquer en mai-juin en ayant soin de couvrir les plants.

**913 LIN vivace varié.**Très bonne plante vivace d fleurs variées prospérant d'toutes expositions.

Semer ! Voir Nº 912.

### 145 LINAIRE varié.

Semer en avril-mai en place ou en potées qu'on met en place sans les diviser. On peut aussi semer en septembre en pépinière ; repiquer de même et hiverner sous châssis froid ou au pied d'un mur au midi en obritant des grands froids; mettre en place au printemps

### 417 LOBÉ LIA erinus varié.

Plante naine, très joile, se couvrant de fleurs toute l'année et permettant de réaliser de petites corbeilles d'un effet ravissant.

Semer en mars-avril sur couche ou fin avril en pépinière; repiquer de même et mettre en place en mai-juin. On peut aussi semer en août-septembre en pépinière, repiquer en godets, hiverner sous châssis ou en serre, pour mettre en place en mai.

Haut. environ I 5 cm. fin mal à octobre.

### 943 LOBÉLIA erinus Crystal Palace.

Variété à fleurs bleu foncé d'un bel effet en corbeilles et bordures.

Semer en mars-avril sur couche ou fin avril en pépinière, repiquer de même et mettre en place en mai-juin. On peut aussi semer en août-septembre en pépinière, repiquer en godets, hiverner sous châssis ou en serre, pour mettre en place en mai.

### 914 LOBÉLIA erinus bleu.

Variété à fleur bleue convenant très bien pour corbeilles et bordures,

Semer en mars-avril sur couche ou fin avril en pépinière, repiquer de mime et mettre en place en mai-juin. On peut aussi semer en août-septembre en pépinière, repiquer en godets, hiverner sous châssis ou en serre pour mettre

### 437 LUNAIRE annuelle (Monnaie du Pape).

Plante d'aspect curieux servant d la composition de bouquets secs.

Semer de fin avril en juillet en pépinière, repiquer de mime, mettre en place à l'automne ou au printemps en tous terrains et toutes expositions. Haut. environ 80 cm. FI. de mai en juin.

467 MIMOSA pudica (sensitive).
Plante élégante et très agréable d'un feuillage léger. Est d'une sensibilité

Semer en février-mars sur couche, repiquer sous châssis en avril et mettre

### 945 MIMULUS cupreus hybride grande fleur variée.

Plante naine très florifère, d'un bel effet pour corbeilles et bordures. Fleurs bizarres, striées et mouchetées, de coloris variés.

Semer sur couche en mars-avril, repiquer en pots qu'on laisse encore sur couche et mettre en place en mai. On sème aussi à l'automne et le plant hiverné sous châssis donne une floraison plus hâtive et plus abondante. Les Mimulus sont très estimés pour la richesse de coloris de leurs fleurs. Cultivés en pots ils sont très recherchés sur les marchés.

1 027 MINA lobata grimpant.

Belle plante grimpante annuelle à végétation rapide. Fleurs en épis rose vif passant à l'oronge.

Semer en février-mars en petits godets sur couche et transplanter en mai, en pleine terre, à exposition chaude. Belle floraison d'août à novembre.

### 418 MUFLIER demi-nain varié (Gueule-de-Loup).

Plante extrémement rustique, venant bien et presque sans soins en tous terrains. Très recherchée pour l'ornementation des plates-bandes et corbeilles, des rochers, vieux murs, etc. Leurs fleurs, aux coloris variés, conviennent particulièrement pour bouquets.

Semer : I° De juin à septembre en pépinière, repiquer de même bonne exposition, abriter des grands froids; mettre en place en avril-mai. - 2" En avrilmai en pépinière, repiquer de même et mettre en place en mai. Haut. environ 35 à 50 cm. FI. de juin en octobre

### 1185 MUFLIER à grande fleur blanche.

Semer · Voir Nº 418.

### 1182 MUFLIER à grande fleur jaune pur.

Semer | Voir N" 418.

### 1 184 MUFLIER à grande fleur rouge grenat.

Semer : Voir Nº 418.

### 438 MYOSOTIS des Alpes bleu.

Plante particulièrement rustique poussant facilement. Très recommandée pour l'ornementation des corbeilles.

Semer de juillet en septembre, repiquer à mi-ombre et transplanter en place en octobre-novembre à 25 cm. de distance. Fleur bleue très abondante au printemps suivant. Haut. 20 30 cm. FI. de mai en août.

439 MYOSOTIS des Alpes rose.

Plante particulièrement rustique poussant facilement. Très recommandée pour l'ornementation des corbeilles.

Semer de juillet en septembre repiquer à mi-ombre et mettre en place en octobre-novembre à 25 cm. de distance. Fleur rose très abondante au printemps.

### 440 MYOSOTIS des Alpes blanc.

Plante particulièrement rustique poussant facilement. Très recommandée pour l'ornementation des corbeilles.

Semer de juillet en septembre, repiquer à **mi-ombre** et transplanter en place en octobre-novembre à 25 cm. de distance. Haut. 20 à 30 cm. **Fl**. d'avril en juin.

420 ŒILLET-MARGUERITE double varié (de Nice).

Plante des plus appréciées et particulièrement recherchée pour la beauté et le parfum suave de ses fleurs aux coloris riches et diversement nuancés. Les œillets sont du plus bel effet, soit en plates-bandes, soit en corbeilles. Ils conviennent également très bien pour la culture en pots et peuvent ainsi concourir à la décoration de fenêtres, balcons, etc.

Semer : I° En août-septembre en pépinière, repiquer en pépinière au pied d'un mur, ou mieux hiverner sous châssis, mettre en place en mars-avril. —  $2^0$  En février-mars sur couche, repiquer sous châssis froid en avril et mettre en place en mai.

468 ŒILLET PERPÉTUEL à fleur géante race Chabaud varié.

Excellente et rustique race, haute de 40 à 50 cm., à riche et longue floraison, fournissant dès 7 mois après le semis de magnifiques et longues tiges, fortes et rigides, dont les coloris se reproduisent bien par le semis et donnent jusqu'à % de plantes bien doubles.

Semer : I° En août-septembre en pépinière, repiquer en pépinière au pied d'un mur, ou mieux hiverner sous châssis, mettre en place en mars-avril. — 2° En février-mars sur couche, repiquer sous châssis froid en avril et mettre en place en mai.

946 OEILLET PERPÉTUEL à fleur géante race Chabaud blanc de neige

947 ŒILLET PERPÉTUEL à fleur géante race Chabaud rose pâle

948 ŒILLET PERPÉTUEL à fleur géante race Chabaud rose France.

949 ŒILLET PERPÉTUEL à fleur géante race Chabaud carmin.

950 ŒILLET PERPÉTUEL à fleur géante race Chabaud Reine rose vif.

951 OEILLET PERPÉTUEL à fleur géante race Chabaud mauve rosé.

952 ŒILLET PERPÉTUEL à fleur géante race Chabaud aurore.

953 ŒILLET PERPÉTUEL à fleur géante race Chabaud aurore sau-

954 ŒILLET PERPÉTUEL à fleur géante race Chabaud jaune canari.

955 ŒILLET PERPÉTUEL à fleur géante race Chabaud magenta

956 ŒILLET PERPÉTUEL à fleur géante race Chabaud rouge brique.

957 ŒILLET PERPÉTUEL à fleur géante race Chabaud rouge vif.

958 OEILLET PERPÉTUEL à fleur géante race Chabaud rouge rubis.

959 ŒIILET PERPÉTUEL à fleur géante race Chabaud rouge pourpre-

960 ŒILLET PERPÉTUEL à fleur géante race Chabaud Mikado ar

## 962 ŒILLET PERPÉTUEL à fleur géante race Chabaud Princesse

Pour ces variétés même mode de culture que pour Nº 468.

469 ŒILLET PERPÉTUEL géant Enfant de Nice blanc.
L'Œillet perpétuel géant ENFANT DE NICE est le produit d'un croisement entre l'Œillet remonitant de Nice géant et l'Œillet double perpétuel. Il constitue une nouvelle race, fleurissant 7 mois après le semis à tiges extrémement rigides portant des fleurs atteignant 6-7 cm. En pratiquant l'éboutonnage, on obtient des fleurs de première grosseur. Les coloris que nous offrons peuvent se reproduire dans une proportion de 75 °,ô et donner environ 90 % de sujets à fleurs doubles.

Semer :  $1^{\circ}$  en août-septembre en pépinière, repiquer en pépinière au pied d'un mur, ou mieux hiverner sous châssis, mettre en place en mars-avril =  $2^{\circ}$  En février-mars sur couche, repiquer sous chassis froid en avril et mettre en place en mai.

963 ŒILLET PERPÉTUEL géant Enfant de Nice rouge.

964 ŒILLET PERPÉTUEL géant Enfant de Nice rose.

965 ŒILLET PERPÉTUEL géant Enfant de Nice saumon.

966 ŒILLET PERPÉTUEL géant Enfant de Nice panaché.

1490 ŒILLET PERPÉTUEL Enfant de Nice (vieux rose).

1491 ŒILLET PERPÉTUEL Enfant de Nice (pourpre).

1492 ŒILLET PERPÉTUEL Enfant de Nice (mauve).

### 1493 ŒILLET PERPÉTUEL Enfant de Nice (magenta).

Pour ces variétés mime mode de culture que pour N" 469.

### 471 ŒILLET DES FLEURISTES double varié.

Variété très odorante, très appréciée pour fleurs coupées

Semer IIº En août-septembre en pépinière, repiquer en pépinière au pied d'un mur, ou mieux hiverner sous châssis, mettre en place en mars-avril. — 2° En février-mars sur couche, repiquer **sous** châssis froid en avril et mettre en place en mai.

472 ŒILLET MIGNARDISE simple blanc.
Variété donnant de nombreuses fleurs très odorantes, particulièrement appréciées pour bordures et fleurs coupées. Floraison abondante

Semer : I° En août-septembre en pépinière, repiquer en pépinière au pied d'un mur, ou mieux hiverner sous châssis, mettre en place en mars-avril. — 2° En février-mars, sur couche, repiquer sous châssis froid en avril et mettre en place en mai.

### 431 ŒILLET MIGNARDISE simple varié (de bordure).

Race des plus odorantes, rustique et florifère, très employée pour bordures, également précieuse pour fleurs coupées.

Semer d'avril en juillet, en pépinière, en planche, en pots ou en terrines; repiquer en pépinière; mettre en place en automne de préférence, ou au printemps. Les œillets Mignardise sont très recherchés pour bordures. Haut. 20 à 25 cm. FI. de mai en juin.

1 213 ŒILLET DE CHINE double blanc.

Plante annuelle I leurissant de Juin à septembre.

Semer « I° En août-septembre en pépinière, repiquer de mime à bonne exposition, abriter des gelées, mettre en place au printemps.

### 967 ŒILLET D'INDE double nain brun.

Plante éminemment décorative, d'un effet puissant, remarquable en plates-bandes, corbeilles ou bordures. Très robuste, convient pour tous terrains.

Semer : I° Fin février en avril sur couche, repiquer de même; mettre en place en mai. — 2° En avril-mai sous châssis ou en pépinière bien exposée, repiquer en pépinière, mettre en place en mai-juin.

### 916 ŒILLET D'INDE double nain varié.

Plante éminemment décorative, d'un effet puissant, remarquable en plates-bandes, corbeilles ou bordures. Très robuste, convient pour tons terrains.

Semer: Voir Nº 967.

### 473 OEILLET D'INDE simple Légion d'honneur.

Jaune d'or maculé pourpre velouté

Semer : Voir Nº 967.

## **474 PAQUERETTE à grande fleur double blanche.**Petite plante *rustique venant* en tous *terrains* et *formant* d'heureuses *combi-*

naisons avec d'autres fleurs.

Semer de fin juillet à septembre et repiguer de préférence avant l'hiver ou au début du printemps, à environ 25 cm. de distance. La floraison a lieu au printemps de l'année suivante.

### 1232 PAQUERETTE à grande fleur double rouge.

Semer: Voir NO 474.

**421 PAQUERETTE à grande fleur double variée.**Petite plante rustique *venant en tous terrains et formant* d'heureuses *combi*naisons avec d'outres fleurs.

Semer : Voir Nº 474.

1 090 PATISSON artichaut de Jérusalem. Plante se cultivant comme les courges et produisant des petits fruits plats très décoratifs susceptibles d'être consommés d demi formés.

Semer sur une couche en avril ou sur place en mai, donner un paillis et des arrosages fréquents en été.

### 475 PENSÉE à grande fleur blanche.

Plante venant en tous terrains et formant, en corbeilles et plates-bandes, des associations harmonieuses avec d'autres plantes à floraison printanière; convient particulièrement pour la culture en pots et contribue ainsi à la décoration des fenêtres et des balcons

Semer de Juillet en août, repiquer en place en automne en terre bien préparée et à bonne exposition. Se sème aussi en mars-avril, mettre en place en mai.

1091 PENSÉE à grande fleur jaune pur.

477 PENSÉE à grande fleur Faust Roi des Noirs.

Plante venant en tous terrains et formant, en corbeilles et plates-bandes, des associations harmonieuses avec d'autres plantes à floraison printanière; convient particulièrement pour la culture en pots et contribue ainsi à la décoration des fenêtres et des balcons.

1098 PENSÉE demi-deuil Lord Beaconsfield.

917 PENSÉE à grande fleurs variée Trimardeau.

476 PENSÉE à grande fleur ondulée Germania.

441 PENSÉE géante Suisse, variée (Idéale) (Parisienne).

1099 PENSÉE Suisse Berna (bleu foncé).

1102 PENSÉE lac de Thun (bleu clair).

1103 PENSÉE lie de vin (Claret).

Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 475.

### 1164 PENTSTEMON hybride à grande fleur variée.

Elégante plante vivace plutôt cultivée comme plante annuelle. Fleurs en grappes aux vives couleurs.

Semer de fin février en avril en serre ou sur couche, repiquer de mime en godets ou en pépinière; mettre en place en mai-juin. Semer aussi de juin à août en pépinière.

### 478 PERVENCHE de Madagascar (Vinca).

Plante d'été, très décorative en corbeilles et en bordures. Demande de préférence une exposition chaude.

Semer sur couche en mars-avril; repiquer en pots, par deux pieds, qu'on laisse sur couche jusqu'en juin pour hâter le développement.

### 1177 PÉTUNIA hybride double varié.

Très belle variété contenant une grande proportion de fleurs doubles. Au repi-quage, choisir les plants moyens et même faibles de préférence aux plus vigoureux, ceux-ci donnant toujours des fleurs simples.

Semer de février en avril sur couche, en terrines ou en pots bien drainés et en avril-mai en pépinière, repiquer de même en godets de préférence, mettre en place en mai à toutes expositions.

### 1751 PÉTUNIA hybride Superbissima Varié (à très grande fleur et très large gorge).

Semer: Voir N° I I 77.

### 968 PIED-D'ALOUETTE vivace élevé à grandefleur variée.

Plante très robuste constituant un des plus beaux ornements du jardin et poussant en tous terrains. Très appréciée pour les bouquets et la garniture des vases d'appartements.

Semer de février en avril de préférence sur place ou en pépinière pour mettre en place en avril-mai. On peut aussi semer en septembre-octobre en place ou en pépinière; dans ce dernier cas, lever avec soin en motte pour mettre à demeure en mars-avril.

### 969 POIS DE SENTEUR race Spencer à grande fleur ondulée blanc.

Plante élégante donnant des fleurs de parfum suave et aux coloris extrêmement brillants. Les pois de senteur sont sans rivaux pour la décoration des vases d'appartements.

Semer : I° En septembre-octobre pour fleurir de fin mai à juin - 2° En février et mai. Le semis d'automne produit généralement des plantes vigoureuses. Le pois de Senteur se cultive très facilement en pots ou en caisse.

970 POIS DE SENTEUR race Spencer à grande fleur ondulée rose.

971 POIS DE SENTEUR race Spencer à grande fleur ondulée rouge.

### 9 72 POIS DE SENTEUR race Spencer à grande fleur ondulée mauve.

### 973 POIS DE SENTEUR race Spencer à grande fleur ondulée violet

Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 969.

### 918 POIS vivace varié.

Plante très résistante donnant des fleurs en forme de grappes.

Semer de mars en juillet en place au pied d'un mur ou en pépinière; repiquer à bonne exposition à l'automne ou au printemps.

### 1 350 POURPIER à grande fleur double variée.

Variété aux brillants coloris, précieuse pour l'ornementation des endroits les plus chauds et les plus ensoleillés.

Semer en mars-avril sur couche, ou en avril-mai en pépinière, repiquer de même, mettre à demeure en mai à bonne exposition. On peut aussi semer en place en mai.

### 422 PRIMEVÈRE des Jardins variée.

Plante rustique venant bien en tous terrains. Une des premières fleurs du

Semer au printemps en terrines sur couche, ou mieux dès que la graine est récoltée, dans une terre douce et légère; lorsque les plants ont quelques feuilles, les repiquer en pépinière ou *en* godets; mettre en place à l'automne ou au printemps, mais en levant les pieds avec une motte de terre, afin de ne pas nuire à la floraison qui est prochaine à ce moment-là. Très avantageusement employée en bordures.

Haut, environ 15 cm. FI. de mars à mai.

### 1180 PRIMEVÈRE de Chine frangée variée.

Cultivée comme plante bisannuelle pour la décoration des serres et des appar-

Semer de juin en juillet en terrines ou en pots, en terre légère, saine et à mi-ombre, repiquer les petits plants en godets et séparément et les rempoter au fur et à mesure que les plants prennent de la force.

### 1 181 PRIMEVÈRE obconica à grande fleur variée.

Fleurs en ombelles plus légères que les fleurs des Primevères de Chine.

Semer en mars-avril en terrines, sous châssis à froid; repiquer en godets d'air. On peut obtenir ainsi une abondante floraison jusqu'en hiver.

### I 186 PRIMEVÈRE auricule variée.

Variété à très grandes feuilles et à fleurs en ombelles résistant très bien au

Semer en mai-août en terrines, en terreau de feuilles sableux, tenir humide et à l'ombre; repiquer les semis, plus tard les empoter; demandent une exposition aérée et ombragée en été, et en hiver beaucoup de lumière et une température de 4° C.

### 1 205 PYRÈTHRE rose double varié.

Plante vivace aux fleurs portées sur de longues tiges. Donne une deuxième floraison à l'automne.

Semer I l' De juillet en septembre en pépinière, repiquer en pépinière ou en pots, hiverner sous châssis froid, mettre en place en avril-mai. — 2º Et de pré-férence de février en avril sur couche, repiquer sur couche, mettre en place en avril-mai.

### 479 REINE-MARGUERITE élevée géante de Californie, blanche.

Plantes tenant une place capitale dans l'ornementation des jardins. Leur culture très facile, la vigueur et l'éclat du coloris des fleurs les font particulièrement rechercher pour la garniture des corbeilles, conviennent aussi pour potées et fleurs coupées.

Semer :  $I^{\circ}$  En pépinière en mars-avril sur couche, 'repiquer sur couche. Mettre en place en mai. —  $2^{\circ}$  Fin mars-avril sous châssis froid, sous cloche ou en pleine terre au pied d'un mur au midi; repiquer en pépinière en pleine terre à bonne exposition; planter en mai-juin.

480 REINE-MAGUERITE élevée géante de Californie variée.

481 REINE-MARGUERITE élevée. Comète géante blanche.

424 REINE-MARGUERITE élevée. Comète géante variée.

482 REINE-MARGUERITE grande, Plume d'Autruche blanche. Haut, environ 35 cm. FI. de juin en septembre

425 REINE-MARGUERITE grande. Plume d'Autruche variée.

1342 REINE-MARGUERITE des fleuristes blanche.

1347 REINE-MARGUERITE des Fleuristes bleu clair.

1348 REINE-MARGUERITE des Fleuristes bleu azur. 2835 REINE-MARGUERITE des Fleuristes bleu foncé.

2833 REINE-MARGUERITE des Fleuristes rose vif.

1344 REINE-MARGUERITE des Fleuristes rose pâle hâtive.

1345 REINE-MARGUERITE des Fleuristes carmin.

2838 REINE-MARGUERITE des Fleuristes rouge magenta.

2837 REINE-MARGUERITE des Fleuristes lavande.

- 1753 REINE-MARGUERITE des Fleuristes violet foncé.
- 1 343 REINE-MARGUERITE des Fleuristes mélange toutes couleurs.
- 1755 REINE-MARGUERITE des Fleuristes bleu liseré blanc.
- 1754 REINE-MARGUERITE des Fleuristes rose tendre liseré blanc
- 1757 REINE-MARGUERITE des Fleuristes cramoisi liseré blan
- 1756 REINE-MARGUERITE des Fleuristes violet liseré blanc.
- 1 349 REINE-MARGUERITE des Fleuristes mélange toutes couleurs
- 483 REINE-MARGUERITE grande Unicum variée.
- 484 REINE-MARGUERITE demi-naine, Reine des Halles, blanche.
- 426 REINE-MARGUERITE demi-naine Reine des Halles varie
- 485 REINE-MARGUERITE naine, à fleur de chrysanthème, blanche.
- 442 REINE-MARGUERITE naine, à fleur de chrysanthème variée.

Pour ces variétés même mode de culture que pour Nº 479.

### 486 RÉSÉDA Machet odorant amélioré à grande fleur.

Plante vigoureuse, port compact. Forme de très belles potées.

Semer  $\,$ ! I° Fin août et septembre en pots  $\,$ ou  $\,$ en pépinière bien exposés, abriter des gelées, mettre en place au printemps. - 2° De fin février en avril sur couche en pots ou en pépinière; mettre à demeure en mai. - 3° En place en plein air de mal à juin.

### 427 RICIN sanguin.

Plante ornementale remarquable par sa coloration pourpre.

Semer sur couche d'avril en mai; repiquer en mai-juin. On peut semer en

Plante pittoresque à feuillage ornemental. Haut. 2 m. à 2 m. 50.

### 428 SAUGE Splendens rouge éclatant (Salvia Splendens).

Plante éminemment décorative donnant de belles et nombreuses fleurs, très appréciée pour massifs et culture en pots.

Semer sur couche de mars à mai pour repiquer fin mai en espaçant **de 30** à 50 cm. La floraison a lieu dans le courant de l'été.

### 487 SAUGE Splendens naine incendie.

Plante éminemment décorative donnant de belles et nombreuses fleurs, très appréciée pour massifs et culture en pots.

Semer sur couche de mars à mai pour repiquer fin mai en espaçant de 30 à 50 cm. La floraison a lieu dans le courant de l'été.

### 920 SCABIEUSE double naine variée.

Plante robuste, des plus recommandables pour la décoration des plates-bandes et des corbeilles. Vient bien en tous terrains et à toutes expositions.

Semer sur couche ou en plein air à bonne exposition en avril-mai, repiquer en juin. Ou semer en automne et repiquer au pied d'un mur. Floraison très abon-

**429 SOLEIL grand double en mélange.**Plante très robuste et généralement gigantesque. Convient pour la composition des massifs, l'ornementation des plates-bandes et des parties dénudées des grands jardins.

Semer en place en avril-mai, ou en pépinière et repiquer en juin. Haut. I m. à I m. 50. FI. d'août en octobre.

921 **SOLEIL double fleur de chrysanthème.**Fleurs jaune brillant, déchiquetées et laciniées.

Semer en place en avril-mai, ou en pépinière et repiquer en juin.

976 SOLEIL grand annuus globosus fistulosus fleur pleine.
Plante très robuste et généralement gigantesque. Convient pour la composition des massifs, l'ornementation des plates-bandes et des parties dénudées des grands jardins.

Semer en place en avril-mai, ou en pépinière et repiquer en juin.

### 443 STATICE bonduelli,

Plante d feuillage remarquable, très appréciée pour la composition de cor-beilles, de bouquets frais et secs.

Semer clair en février-mars en terre de bruyère en pots bien drainés, en serre ou sur couche, lever le plant *en* mottes si possible, repiquer en pots, qu'on laissera sous châssis, planter en avril-mai.

### 488 STATICE sinuata varié.

Les S. sinuata fleurissent abondamment de juin en septembre. Des plus recommandables pour plates-bandes et des plus utiles pour fleurs coupées à l'état frais ou sec

Semer clair en février-mars, en terre de bruyère en pots bien drainés en serre ou sur couche, lever le plant en mottes si possible, repiquer en pots, qu'on laissera sous châssis, planter en avril-mai.

### 489 TABAC géant à grande fleur pourpre.

Plante magnifique et particulièrement décorative en raison de son grand feuil-

Semer : I° En avril sur couche, repiquer sur couche, planter en mai. mal, en pépinière bien exposée, ou des fin avril sous cloche; planter en juin. Feuillage très ample et ornemental.

### 491 THLAPSI blanc (Ibérie amara).

Plante rustique venant en tous terrains. Particulièrement précieuse pour l'or-nementation des plates-bandes et la disposition des corbeilles.

Semer de février-mars en juillet en place ou en pépinière; mettre en **place** en avril-mai.

### 493 THLASPI umbellata varié.

Semer: Voir Nº 491.

### 494 VERVEINE hybride à grande fleur blanche.

Plante extrêmement vigoureuse et robuste. Très appréciée dans les jardins où elle se prête à la formation d'élégantes corbeilles. Elle peut aussi étre cultivée en pots et servir à la décoration des fenêtres et des balcons.

Semer sur couche en mars-avril, repiquer sur couche ou en petits pots, mettre en place en mai. On peut semer également en automne et hiverner sous

### 444 VIOLA Cornuta (de Paris) bleue.

Petite plante de culture facile et venant en tous terrains où elle est du plus gracieux effet.

Semer de juillet en septembre ou de mars en juin en place, ou mieux, en pépinière et repiquer en pépinière pour mettre en place en automne, de préférence, ou au printemps. La germination n'a lieu généralement qu'au printemps suivant le semis. Haut. 10à 20 cm. FI. en mars-avril et en automne.

### 922 VIOLA Cornuta (de Paris) jaune.

Petite plante de culture facile et venant en tous terrains où elle est du plu gracieux effet.

Semer: Voir Nº 444

### 923 VIOLA Cornuta (de Paris) varié.

Petite plante de culture facile et venant en tous terrains où elle est du plus gracieux effet.

Semer: Voir Nº 444.

### 430 VIOLETTE odorante des quatre saisons.

Les violettes odorantes sont des plantes vivaces faciles à cultiver, elles viennent bien en tous terrains et se plaisent surtout aux expositions ombragées.

Semer de juillet en septembre ou de mars en juin en place, ou mieux, en pépinière et repiquer en pépinière pour mettre en place en automne, de préférence, ou au printemps. La germination n'a lieu qu'au printemps suivant

Haut, 1 0 à 20 cm. Fl. en mars-avril et en automne.

### 1441 ZINNIA double à fleur géante de Dahlia blanc pur.

Semer : I° En avril sur couche; repiquer sur couche; mettre en place en mai. — 2º En avril-mai en pépinière, en planche, en terre légère à bonne exposition; repiquer en place ou en pépinière d'attente. Lever le plan en motte et mettre en place en juin-juillet. Haut. 60 à 80 cm. F1. de juin jusqu'aux aelées.

- 1442 ZINNIA double à fleur géante de Dahlia mauve clair.
- 1443 ZINNIA double à fleur géante de Dahlia orange
- 1444 ZINNIA double à fleur géante de Dahlia rose pâle à centre plis foncé.
- 1445 ZINNIA double à fleur géante de Dahlia rose.
- 1449 ZINNIA double à fleur géante de Dahlia lavande.
- 1450 ZINNIA double à fleur géante de Dahlia citron bord rose.
- 1451 ZINNIA double à fleur géante de Dahlia jaune canari.
- 1453 ZINNIA double à fleur géante de Dahlia jaune orange et rouge
- 1455 ZINNIA double à fleur géante de Dahlia écarlate.
- 458 ZINNIA double à fleur géante de Dablia rouge.
- 1 460 ZINNIA double à fleur géante de Dahlia varié. Pour ces variétés même mode de culture que pour N" 1441.

### 495 GRAINES DE FLEURS grimpantes en mélange.

Beau mélange de fleurs grimpantes variées pour tonnelles, pergolas, donnent un ombrage abondant agrémenté de jolies fleurs variées,

Semer en place au printemps; couvrir peu les graines et presser la terre. Il n'est utile d'arroser, pour faciliter la germination, que si le temps est trop sec,

### 924 JARDIN FLEURI « LE PAYSAN » (fleurs annuelles).

Mélange de fleurs annuelles telles que : Balsamine, Reine-Marguerite, Pois de senteur, etc., elles produiront un très bel <sub>effet</sub> et un mélange de coloris

Semer en place au printemps, couvrir peu les graines et presser la terre, II n'est utile d'arroser pour faciliter la germination, que si le temps est trop sec.

925 BALCONS FLEURIS « LE PAYSAN » (plantes de pots).

Mélange de fleurs cultivées en potées telles que : Balsamine, Pourpier Balsamine, Pourpier Reine-Marguerite naine, etc... elles feront un très bel effet et conviendront parfaitement pour la garniture des balcons.

Ce sachet contient 10 variétés de plantes ou fleurs de pots. Semer au printemps sous châssis ou à bonne exposition; repiquer en mai-juin en potées ou corbeilles.

### 926 GAZON japonais (gazon du Paradis).

Mélange de fleurs annuelles et graminées ornementales naines en mélanges.

Ce sachet contient 7 variétés de fleurs annuelles et 7 variétés de graminées ornementales naines. Les graines doivent être semées en place au printemps à la volée.

### 927 GAZON ..... (gazon fleuri).

Mélange d base de Ray-Grass de Percey agrémenté de fleurs variées

Ce sachet contient 50% de Ray-grass de Percey et d'un grand nombre de fleurs variées. Se sème en place au printemps à la volée pour floraison éche-



### **BETTERAVES FOURRAGÈRES** (de nos cultures sélectionnées)

### 711 JAUNE OVOIDE DES BARRES améliorée.

Excellente variété rustique et très productive.

Semer, en place de fin mars à mai en lignes distantes de 60 à 80 cm, en terre bien fumée et bien ameublie. Eclaircir quand le planta quelques feuilles en laissant une plante tous les 40

à 50 cm. Sarcler et biner. Récolte fin septembre à octobre.

### 710 GÉANTE ROSE (demi-sucrière à collet rose).

Même qualité que la précédente, deux tiers hors terre.

Semer: Voir Nº 7:1.

### 708 EN MÉLANGE.

Mélange des variétés de Betteraves fourragères.

Semer : Voir Nº 711.

### DIVERS

### 800 LUZERNE DE PROVENCE décuscutée (qualité extra).

Espèce recommandée donnant un fourrage de grande qualité

Semer au printemps, en mars-avril, dans une céréale de printemps : avoine, blé de mars ou orge, qui abritera les jeunes plantes lors de la levée et pendant le cours de l'été. On commencera à couper la luzerne au printemps suivant,

### 801 TRÈFLE VIOLET décuscuté.

lante bisannuelle donnant deux coupes d'un fourrage très abondant

Semer au printemps, en mars-avril, dans une céréale de printemps : avoine, blé de mars ou orge, qui abritera les jeunes plantes lors de la levéet pendant le cours de l'été. On commence à couper le trèfle violet au printemps suivant.

803 GRAINES POUR OISEAUX (sans germination). Mélange de Chicorée, Laitue, Radis, Cressonnette, Mill germination d utiliser pour la nourriture des oiseaux.

### 555 FÈVE DES MARAIS

Cosse de 10 d 12 cm de 3 d 4 groins.

Semer : I° En février-mars en place ou en janvier sous couche, repiquer en février. Pincer les plantes à la floraison.

### 572 FÈVE D'AGUADULCE à longue cosse.

Belle cosse de 30 à 35 cm., gros grains moins aplatis que ceux de la Fève de Séville, variété légèrement plus tardive.

Semer "I° En février-mars en place ou en janvier sous couche, repiquer en février. Pincer les plantes à la floraison.

### HARICOTS A RAMES A PARCHEMIN

544 SABRE à très longue et très large cosse. Grain blanc excellent, écossé frais, variété très productive, cosse de 25 d 30 cm.

Semer : I° De mai à fin juin pour récolter en grains secs. —  $2^\circ$  De mai à fin juin pour récolter en grains frais. —  $3^\circ$  De mai à fin juillet pour récolter en filets (haricots verts).

502 DE SOISSONS blanc à rame.

Variété très productive, très couramment employée pour consommer en sec.

Semer  $\,!\,\, {
m I^{o}}\,\, {
m \it De}\,\, {
m \it mai}\,\, {
m {\dot a}}\,\, {
m fin}\,\, {
m juin}\,\, {
m pour}\,\, {
m r\'ecolter}\,\, {
m en}\,\, {
m grains}\,\, {
m secs.}\,\, -2^{\,0}\,\, {
m De}\,\, {
m mai}\,\, {
m {\dot a}}\,\, {
m fin}\,\,$ juillet pour récolter en grains frais.

### 556 D'ESPAGNE blanc.

Très rustique, gros grain blanc. Cueilli en vert fournit un grain tendre d'un goût fin peut servir également de plante ornementale, ce haricot pouvant atteindre 3 m. de haut.

Semer II l° De mai à fin juin pour récolter en grains secs. — 2° De mai à fin juillet pour récolter en grains frais.

### 503 D'ESPAGNE varié.

Mélange des variétés ci-dessus, très ornemental.

Semer I I° De mai à fin juin pour récolter en grains secs. — 2° De mai à fin juin pour récolter en grains frais.

### **HARICOTS A RAMES** SANS PARCHEMIN OU MANGETOUT

### SOI EXTRA-HATIF (mangetout cosse verte).

Très belle sorte hâtive, cosses bien mangetout, charnues, sans fil.

Semer : I° De mai à fin juin pour récolter en grains secs. — 2° De mai à fin juillet pour récolter en grains frais. — 3° De mai à fin août pour récolter en filets (haricots verts) ou consommer les cosses toutes venues. – 2° De mai à fin

### 545 PRINCESSE sans filet petit grain blanc (mangetout riz).

vertes, droites, charnues

### 504 BEURRE D'ALGER NOIR (cosse jaune).

Très hật if, très productif.

### 506 BEURRE DU MONT-D'OR (cosse jaune).

Longues cosses, hatif, très productif.

### SOS BEURRE ROI DES MANGETOUTS grain blanc (cosse jaune).

Cosses rondes, bien sans fil grain blanc

## 573 MANGETOUT DE SAINT-FIACRE brun (cosse blonde). Diffère de la variété Haricot mangetout de Saint-Fiacre brun cosse verte en

ce que les cosses sont d'un joli vert blond.

## **509 MANGETOUT DE SAINT-FIACRE blanc.** *Grain blanc* de qualité excellente.

### 513 PHÉNOMÈNE A RAMES.

Cosses longues et vertes, sons fil.

### 510 COCO BICOLORE DU PAPE.

droites,

### SI I COCO BLANC (gros Sophie) (Mongeon blanc).

Très productif.

### 512 COCO ROSE A RAMES (de Prague marbré à rames) (Boulot).

Cosses vertes lavées de rouge à la maturité

514 CROCHU ROSE DE YACQUEYRAS.
Ces deux variétés hôtives sont très estimées pour être mangées en vert, les cosses étant bien avancées sont absolument sans fil et charnues en forme

557 MANGETOUT DE LA VALLÉE.

Cosses rondes, longues et très chamues. Grain café ou lait d ombilic cerclé de rouge.

Pour ces variétés même mode de culture que pour  $\,N^{\circ}\,501.$ 

### HARICOTS DOLIQUES A RAMES

### 558 DOLIQUE ASPERGE ou Haricot Asperge.

Haricot pouvant atteindre 2 d 3 m. de hauteur, donnant des cosses fines et longues, se consommant seulement en vert.

Semer début mai à juin pour récolter en filets (haricots verts). Demande un climat chaud.

### HARICOTS NAINS A PARCHEMIN

547 FLAGEOLET blanc d'Etampes extra. Sorte bien naine, cosses fines et tendres, grain blanc.

Semer ! I° **De** mai à fin juin pour récolter en grains secs. — 2° De mai à fin juillet pour récolter en grains frais. — 3° De mai à fin août pour récolter en filets (haricots verts)

### 546 FLAGEOLET blanc à feuille d'ortie.

Très hâtif, très productif, feuillage cloqué.

Semer: voir Nº 547.

### 518 FLAGEOLET du Bouscat.

Belles cosses longues, grain jaune clair.

Semer # voir No 547.

517 FLAGEOLET Triomphe des châssis.

Convient très bien à la culture sous châssis et de pleine terre, grain vert.

Semer : 1° De février-mars sur couche sous châssis ou en pleine terre de mai à juin, etc., pour récolte en grains secs. — 2° De mai à fin juillet pour récolter en grains frais. — 3° De mai à fin août pour récolter en filets (haricots verts).

# 519 FLAGEOLET jaune du Perroux ou Prodige de Courtry (nain de Saint-André). Hâtif, très productif, filet rond.

Semer : I° De mai à fin juin pour récolter en grains secs. — 2° De mai à fin juillet pour récolter en grains frais. — 3° De mai à fin août pour récolter. en filets (haricots verts).

### S50 FLAGEOLET rouge rognon de coq.

Très rustique, très productif, grain rouge très bon à consommer en sec.

548 INCOMPARABLE (Express).

Belle sorte très productive et hâtive, joli filet vert.

### 549 INÉPUISABLE.

Floraison se faisant au-dessus de la plante, donnant de jolis filets longs et tendres. Pour ces variétés même mode de culture que Nº 519

### 520 EMPEREUR DE RUSSIE.

Aiguille. fine rustique et de grande production, très recommandée, grain café au lait moucheté de plus foncé.

Semer de mai à fin août pour récolter en filets (haricots verts).

### **521 SURPASSE EMPEREUR.**

Cosses longues et rondes, sorte hâtive, grain jaune crème.

### 551 MERVEILLE DE PARIS (Quarantain).

Cosses longues et rondes, grain chamois, marbré de violet foncé.

### 552 GRIS DE BAGNOLET ou petit gris.

Pour consommation en vert et pour conserves, grain violet noirâtre panaché

### 522 NOIR DE L'HERMITAGE.

Grain noir, belles cosses droites, très productif.

### **523 JAUNE CENT POUR UN.**

Grain jaune, très productif, cosses vertes petites, bien pleines.

### 559 JAUNE CENT POUR UN à longue cosse.

Cosses longues droites, grain fin allongé jaune d'or. Variété tardive.

### 528 ROI DES BELGES (Métis noir).

Grain noir de même précocité que le H. Métis, il a en plus l'avantage d'avoir les cosses plus charnues et plus vertes et d'être de plus grande production.

### SIS MÉTIS MAIREAU OU MAROCAIN.

Très hâtif, vigoureux, résistant aux maladies, filet rond tendre, grain mi-partie blanc et brun.

### 560 MÉTIS JAUNE DES ALLIÉS (le Prodigieux).

Haricot très nain, précoce, joli filet rond et charnu.

### **56I SUPERMÉTIS.**

Sorte vigoureuse donnant un filet long bien rond, sans fil, grain mi-partie blanc et violacé.

### **529 SHAH DE PERSE.**

Grain noir, cosses très longues et cylindriques.

### 592 TRIOMPHE DE FARCY.

Très bonne variété résistant aux maladies, filet long, très rond et charnu grain marbré foncé.

### 562 BAGNOLAIS (de Bagnole).

Grain café au lait moucheté, amélioration de l'Empereur de Russie, cosses bien cylindriques, absolument sans fil.

Pour ces variétés mime mode de culture que pour NO 520.

### 563 CAGNEUX.

Très bonne variété à écosser, hâtive, très productive

Semer  ${
m I\hspace{-.1em}I}$   ${
m I^{o}}$  De mai à fin juin pour récolter en grains secs. - 2° De mal à fin juillet pour récolter en grains frais.

### 526 NAIN BLANC MICHELET ou Cagneux amélioré.

Excellente variété à écosser, très hâtif, très productif, cosses supportant très bien l'expédition.

### 574 FÉVETTE des MARAICHERS.

Variété très rustique, recommandable comme haricot d'écosser, convenant très bien à la grosse culture.

### 530 SOISSONS NAIN (gros pied) (Palaiseau).

Variété un peu tardive, très productive, très recommandable pour consommer

**531 SAINT-ESPRIT (à la Religieuse).**Cosses droites assez longues donnant un gros grain blanc taché de noir.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 563.

### HARICOTS NAINS SANS PARCHEMIN OU MANGETOUT

### S34 NAIN BEURRE D'OLLAINVILLE (cosse jaune).

Cosses droites et fines, grain rosé,

De mai à fin août pour récolter en filets ou consommer les cosses toute

### 533 NAIN BEURRE D'ALGER GRAIN NOIR (cosse jaune).

Grain noir ovoïde, cosses très charnues d'un jaune beurre

### 536 NAIN BEURRE DORÉ (cosse jaune).

Grain ovoïde jaune d'or, très productif, cosses jaunes rondes et charnues.

## 564 NAIN BEURRE SANS RIVAL (beurre Cent pour un), (cosse

Très rustique, donnant de belles cosses jaunes, longues et charnues.

### 553 NAIN BEURRE IDÉAL (grain blanc) (cosse jaune).

Cosses droites, demande à être cueilli en filet avant complet développement.

### 554 NAIN BEURRE ROI DES BEURRES (grain blanc) (cosse jaune),

Belles cosses jaunes, crochues, très charnues, absolument sans fil.

### 565 NAIN BEURRE AIGUILLE (cosse jaune).

Haricot métis, cosses jaunes, grain noir et blanc, filet long et rond, sans fil

### 566 NAIN BEURRE RAPIDE (cosse jaune).

Très hâtif et très rustique, cosses jaunes, longues, bien rondes, chamues, grain mi-partie blanc et violacé.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 534.

### 538 NAIN COCO MARBRE (de Prague nain).

Hâtif, cosses vertes lavées de rouge

Semer  ${
m I}$   ${
m I}$   ${
m I}$   ${
m O}$  De mai à fin juillet pour récolter en grains frais. -  ${
m 2}$   ${
m O}$  De mai à fin août pour récolter en filets (haricots verts).

### 567 MERVEILLE DU MARCHÉ ou Cafeton (cosse verte).

Grain ovoïde, couleur café au lait, variété hâtive et très productive, excellente pour manger en vert.

### 539 COCO NAIN BLANC (goulu).

Variété très rustique, très productive, excellente pour consommer en vert

### 575 COCO NAIN BLANC très hâtif non filant.

Amélioration de la sorte H, Coco nain blanc, les plantes ne s'allongeant pas en cours de végétation et restant toujours très naines.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N. 538.

### **541 NAIN MANGETOUT PROGRÈS.**

Longues cosses rondes bien charnues et sons fil, variété hâtive et de grand mérite.

De mai à fin août pour récolter en filets (haricots verts) ou consommer les

### 568 NAIN MANGETOUT MARCHÉ DE GENÈVE (mangetout du Rhin).

Cosses absolument sans fil, grain brun allongé.

Semer de mai à fin août pour récolter en filets (haricots verts) ou consommer les cosses toutes venues.

### 659 NAIN MANGETOUT SAXA.

Hâtif, cosses longues charnues sans fil, grain chamois.

Semer de mai à fin août *pour* récolter en filets (haricots verts) ou consommer les cosses toutes venues

### 542 NAIN MANGETOUT EXTRA-HATIF BARAQUET.

Grain blanc ovale allongé, précoce, cosses arquées rondes et très charnues.

Semer : I° De mal à fin juin pour récolter en grains secs. — 2° De mai à fin juillet pour récolter en grains frais. — 3° De mai à fin août pour récolter en filets (haricots verts) ou consommer les cosses toutes venues.

### 543 PRINCESSE NAIN A GROSSE COSSE.

Cosses larges très charnues, absolument sans fil, groin ovoïde.

Semer  $\sharp$  I $^{\circ}$  De mai à fin juin pour récolter en grains secs. —  $2^{\circ}$  De mai à fin

juillet pour consommer en filets ou cosses toutes venues et récolter en grains frais. — 3° De mai à fin août pour récolter en filets (haricots verts).

### **569 FIN DE MONTREUX.**

Cosses droites dont le filet très fin, arrondi, est sans fil d l'état jeune. Variété demi-tardive très rustique.


Semer de mai à fin août pour récolter en filets (haricots verts).

### 570 PREDOMME NAIN (petit carré de Caen).

Cosse verte bien charnue donnant un petit grain blanc de forme ovoïde. Semer: voir N° 543.

### 571 NAIN COCO DE CHINE GROS GRAIN.

Variété rustique tardive, grain jaune clair excellent d consommer frais ou sec. Semer: voir N° 543.



## POIS A ÉCOSSER A RAMES A GRAIN ROND

### 636 SAXA ou serpette de mai.

Très productif, cosse en serpette, hauteur 80 cm.

Semer ; I° De novembre en décembre, en place, à bonne exposition. Récolte en  $\mathbf{avr}|\mathbf{i-mi}$ . — De février en avril, en place, en rayons ou par touffes (6 à  $\mathbf{8}$  grains par touffe). Récolte de Juin en juillet.— 3° de mai en juin, pour récolter d'août en septembre.

### 641 DE CHATENAY.

Variété demi-hâtive d cosse droite de 6 d 7 grains, hauteur I m. 20.

### 603 SERPETTE EXPRESS GRAIN VERT.

Grain vert très hâtif très en faveur dans le Midi, hauteur 75 cm.

### 647 LE BIENVENU.

Variété hâtive productive, cosse blonde, forme serpette, grain vert, hauteur 80 cm.

## 604 SERPETTE D'AUVERGNE AMÉLIORÉ (Faucille) (Crochu) (Bec).

### 626 EXPRESS A LONGUE COSSE (le Généreux).

Variété hâtive, très productive, cosse recourbée plus longue que l'Express d'Alaska, hauteur 90 cm.

### 628 MICHAUX DE HOLLANDE (Prodige) (Sainte-Catherine).

Pois demi-hâtif, très recherché pour conserves, hauteur | m.

### 627 QUARANTE-DEUX DE SARCELLES amélioré.

 $\it Tr$ ès belle  $\it variét$ é à cosses accouplées, très productive,  $\it tr$ ès recherchée pour les  $\it conserves$ ,  $\it hauteur I \, m$ .

### 637 MERVEILLE D'ÉTAMPES.

Belle variété demi-hâtive, cosse blonde renfermant 8 à 9 grains blancs. Convient parfaitement pour conserves, hauteur I m. 35.

### 638 ROI DES CONSERVES.

Variété demi-hâtive à cosses longues en forme de serpette contenant 9 à 10 grains. Très estimée pour conserves en raison du grain petit et bien vert, hauteur I m. 30.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 636.

### POIS A ÉCOSSER A RAMES A GRAIN RIDÉ

### 605 GRADUS.

Cosse longue et large, grain ridé blanc très sucré, hauteur 90 centimètres Semer : 1º De février en avril, en place, en rayons ou par touffes (6 à 8 grains par touffe). Récolte de juillet en août. — 2° De mai en juin, pour récolter d'août en septembre.

### 630 ALDERMAN (Roi des Halles).

Groin vert, demi-hâtif, belles cosses longues vertes, hauteur l m. 40.

### 629 DUC D'ALBANY.

Grain vert tardif, cosses vertes et larges, hauteur I m. 40.

### 609 DE KNIGHT SUCRÉ (grain vert).

Variété tardive, très productive, grain vert très sucré, hauteur 75 cm.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N. 605.

# POIS A ÉCOSSER NAIN A GRAIN ROND

### 610 TRÈS NATIF D'ANNONAY (nain quarantaine).

Grain blanc, très productif, très recommandé, hauteur 30 cm.

Semer : I° De novembre en février, sur couche et sous châssis. Récolte d'avril en mai. — 2° De février en juin, en pleine terre, en place, en rayons ou par touffes (6 à 8 grains par touffes). Récolte de juin en septembre. Semer aussi en juillet pour récolter en septembre-octobre.

### **631 GONTIER BLANC.**

Variété très hâtive d bon grain blanc, hauteur 30 cm.

Semer :  $I^o$  De novembre en décembre, en place, à bonne exposition. Récolte en avril-mai. —  $2^o$  De février en avril, en place, en rayons ou par touffes (6 à 8 grains par touffe). Récolte de Juin en juillet. —  $3^o$  De mai en juin pour récolter d'août en septembre.

### 613 NAIN L'UNIQUE GRAIN VERT.

Variété hâtive, cosse en serpette, grain vert, hauteur 30 cm,

### 612 DU CHEMIN LONG Nº4.

Grain blanc, recommandé pour le littoral méditerranéen, variété très rustique hauteur 45 cm.

### 632 NAIN SERPETTE CENT POUR UN (grain blanc).

Variété demi-hâtive, belles cosses accouplées en serpette contenant 8 d 9 grains petits, très appréciés pour les conserves, hauteur 65 cm.

### 614 ORGUEIL DU MARCHÉ.

Grain vert d large cosse vert foncé, de grande production, demi-hâtif, hauteur 60 cm.

### 616 GLADIATEUR.

Grain vert très productif, hauteur 75 cm.

Pour ces variétés même mode de culture que pour N° 631.

### POIS A ÉCOSSER NAIN A GRAIN RIDÉ

### 618 MERVEILLE D'ANGLETERRE.

Grain vert ridé, hauteur 35 cm.

Semer : I° De février à avril, en place, en rayons ou par touffes (6 à 8 grains par touffe). Récolte de juillet en août.— 2° De mai en juin, pour récolter d'août en septembre.

### 619 GLOIRE DE WITHAM.

Grain vert ridé, hâtif et très productif, hauteur 35 cm.

### 620 SERPETTE RIDÉ NAIN VERT (William Hurst).

Grain varié ridé, cosse en forme de serpette, précoce, très recommandé. hauteur 30 cm.

### 639 MERVEILLE DE KELVEDON.

Variété hâtive en forme de serpette, vert foncé, très productive, très recherchée pour primeurs, grain ridé, vert, sucré, hauteur 35 cm.

Semer : 1° De novembre en février, sur couche et sous châssis. Récolte d'avril en mai. — 2° De février en juin en pleine terre, en place, en rayons ou par toufés (6 à 8 grains par touffe). Récolte de juin en septembre. Semer aussi en juillet pour récolter en septembre-octobre.

### **621 NAIN PIONNIER.**

Belle cosse large, contenant 8 d 9 grains verts, ridés, hauteur 60 cm.

### 633 TÉLÉPHONE NAIN (Daisy).

Demi-tardif, cosses blondes très larges, hauteur 60 cm.

### 650 RIDÉ NAIN VERT hâtif (pois Napoléon).

Variété précoce, productive grain ridé vert, hauteur 60 cm.

### 622 PROGRÈS (Laxton).

Variété hâtive, cosse longue de 8 d 10 grains verdâtres, hauteur 60 cm.

Pour ces variétés mime mode de culture que pour N° 618.

# POIS SANS PARCHEMIN OU MANGETOUT A RAMES

### 640 MANGETOUT DE QUARANTE JOURS.

Très hâtif, grain blanc bien mangetout, sans fil, hauteur I m.

Semer : I° De novembre en décembre en place (6 à 8 grains par touffe), récolte en avril-mai, — 2° De février-juin, récolte d'août-septembre.

### 625 FONDANT DE SAINT-DÉSIRAT (fleur blanche).

Grandes cosses droites, épaisses et charnues, groin blanc, hauteu r l m. 50

## 634 GÉANT A TRÈS LARGE COSSE (à la darne) (grain gris, fleur violette.)

Grain gris, fleurs violettes, larges cosses droites et charnues, hauteur I m. 60.

## 651 MANGETOUT DEMI-RAMES A TRÈS LARGE COSSE (Carouby) (cosse blonde).

Même sorte que le Pois Carouby cosse verte, légèrement plus précoce, plante plus haute, cosse d'un beau blond beurre, hauteur I m.


Pour ces variétés mime mode de culture que pour N° 640.

# POIS SANS PARCHEMIN OU MANGETOUT NAIN

### 635 MANGETOUT A LA REINE.

Variété s'accommodant très bien sous châssis et en bordure, cosse épaisse, charnue, bien mangetout, sans fil, hauteur 60 cm.

Semer : I° De novembre en décembre en place (6 à 8 grains par touffe ) récolte en avril-mai, — 2° De février-juin, récolte d'août-septembre.





- « Le régime végétal apportant à l'économie les trois variétés fondamentales de matériaux nutritifs (albumines, hydrates de carbone, graisses) peut à lui seul suffire à l'alimentation. Il peut remplacer le régime carné, même au point de vue de l'albumine. Il a l'avantage de fournir des albuminoïdes qui ne donnent pas naissance à de l'acide urique.
- « || possède en outre l'avantage de donner lieu dans le tube digestif à beaucoup moins de fermentations anormales et de déchets toxiques dangereux.
- « Le régime végétal, quoi qu'on en ait dit, nourrit tout autant que le régime carné. Certains aliments végétaux possèdent une valeur nutritive supérieure, même au point de vue de l'albumine, aux viandes les plus riches : ils ont l'avantage de fournir, en outre, des hydrocarbones qui manquent presque complètement dans la viande. »

Qui parle ainsi? L'éminent professeur Marcel Labbé, membre de l'Académie de Médecine, dont les travaux font autorité sur la question. Le végétarisme doit entrer dans nos mœurs... que dis-je? il y est déjà. Les carnivores les plus endurcis, obligés par l'atteinte du mal à délaisser leur nourriture favorite pour une consommation exclusive de produits de la terre, se trouvent si bien du changement que le régime carné, responsable de leurs maux, est voué par eux aux gémonies.

C'est vraiment pour le régime végétarien que semble avoir été créée la formule : « L'essayer c'est l'adopter. »

D'ailleurs, pour se convaincre des avantages thérapeutiques et diététiques de toutes sortes que procure la cure de légumes, il n'est que de passer rapidement la « revue médicale » des plus connus d'entre eux. Nous le ferons, sous la conduite du docteur Henri Leclerc « le médecin des plantes », l'auteur des « Légumes de France » et d'un « Précis de Phytothérapie ».

Voilà donc, d'après ce spécialiste renommé, quelles sont les principales et considérables vertus des produits de nos jardins.



## **PLANTES POTAGÈRES**

**Artichaut.** — L'artichaut, on le sait depuis peu, renforce la fonction antitoxique du foie; grâce à lui, on assiste à une diminution très nette des éléments anormaux de l'urine; sa feuille dentelée et armée d'aiguillons (non comestibles) fera une décoction salutaire, associée à la quinine, contre les fièvres paludéennes.

C'est peut-être le légume dont l'action thérapeutique est la plus importante. C'est, en tout cas, l'un de ceux à base d'eau qui fournissent le plus de calories. Il est tonifiant et peut rendre de grands services aux surmenés, aux déprimés et aux convalescents. Il active la fonction du rein et facilite le traitement des diabétiques. Quant à sa feuille, elle renforce considérablement le pouvoir antitoxique du foie, et elle tonifie les cellules. Quelques semaines d'artichaut à tous les repas peuvent produire des effets d'une remarquable efficacité.

Et n'oublions pas, en terminant, que les mêmes feuilles d'artichaut sont employées avec succès contre les crises de paludieme

**Asperge.** — C'est un aliment très sain, recommandable par son action diurétique pour tout individu indemne de lésions des voies urinaires. D'autre part, un conseil : ne pas racler les asperges, mais les peler, comme on pèlerait un poireau ou un oignon. Sans que des études précises aient pu fournir des indications nettes, l'asperge aurait une action heureuse sur le **cœur**, le foie et les organes génitaux.

**Aubergine.** — C'est un excellent légume « trompe-lafaim »; lorsqu'elle est bien apprêtée, elle donne l'illusion d'un mets très nourrissant; alors qu'il n'en est rien. On peut donc en ingérer de fortes proportions sans risquer de grever l'organisme d'un excès de principes nutritifs; gros avantage pour ceux qui sont astreints à un régime de sobriété alimentaire; et aussi pour les obèses, bien entendu.

**Betterave.** — Cette grosse racine, si pleine de saccharose qu'elle fournit les trois quarts de la consommation du sucre dans le monde, n'est pas recommandable aux diabétiques pour cette richesse même; mais elle convient à tous les autres sujets; c'est un sain aliment d'épargne. Cuite, elle est servie en hors-d'oeuvre, ou bien à la fin du repas, s'avère un précieux adjuvant des salades; crue et rapée, elle participe à la basconnaise, plat végétarien par excellence.

**Carotte.** — Le carotène que contient la carotte crue est reconnu depuis peu substance indispensable, non seulement à la croissance des animaux, mais à leur vie même. La consommation de la carotte crue est tout indiquée dans le traitement de la mauvaise croissance et dans celui de l'anémie.

La carotte est l'amie du foie. Elle est interdite aux diabétiques, mais très recommandée aux enfants. Elle s'oppose à la formation de calculs urinaires, se montre bienveillante à l'intestin et adversaire résolue des vers. Son phosphore répare l'usure du cerveau chez les intellectuels. Crue, elle est indi-

quée pour faciliter la croissance et combattre l'anémie, car elle rénove le sang. Elle permet également à l'organisme de mieux lutter contre les microbes. Une indication : ne pas peler les carottes, mais les gratter légèrement.

**Céleri.** — C'est à l'essence de **sédaline** que ce légume doit sa saveur aromatique agréablement stimulante. Véritable apéritif, et de plus **antirhumatismal** — mais pour les estomacs solides — le céleri sera absorbé cuit par les consommateurs les plus délicats; il deviendra ainsi un mets très favorable à la digestion, spécialement recommandé aux convalescents. Enfin, administré pendant quelques jours avant un vermifuge, il en renforcera nettement l'efficacité.

**Chou.** — Le chou ou le chou-fleur, cuit à l'eau, donne de bons résultats contre la dysenterie; c'est aussi un excellent adjuvant du traitement de l'anémie, en ce qu'il favorise la production de l'hémoglobine. Sous forme de choucroute-légume (sans charcuterie), ses ferments lactiques jouent un rôle important dans la « police » du tube digestif.

**Concombre.** — Sa valeur nutritive est presque nulle. C'est un plat « tout en eau ». Mais il ne faut pas mésestimer son action calmante sur les nerveux. Sa plus grande qualité est tout « extérieure » : en application sur la peau, la pommade de concombre fait merveille à l'égard des dermatoses et des prurits.

**Courge.** — Ce légume — dénommé aussi citrouille ou potiron — qui fond si aisément à la cuisson, fournit potages, purées et entremets, est une précieuse ressource pour l'alimentation des enfants, vieillards et convalescents. Elle a, en outre, des effets diurétiques marqués, même dans les néphrites chroniques.

Aux intellectuels, elle apportera l'indispensable phosphore; elle régularisera les fonctions intestinales des constipés. Chez les malades atteints d'affections graves du tube digestif (entérite, dysenterie, fièvre typhoïde), c'est la courge qui permettra de passer des tisanes à l'aliment solide. Quand on sera condamné à la diète complète, on boira avec plaisir de l'eau de courge. Enfin, les graines de courge permettent de se débarrasser du ténia.

Cresson. — Consommé cru, il peut parfois être accusé de déterminer, chez certains sujets prédisposés, des troubles de la vessie; mais il perd, par cuisson, toute action irritante et s'avère salutaire aux diabétiques, aux eczémateux : il provoquerait même la repousse des cheveux! En tout cas, c'est un dépuratif très actif et un antiscorbutique; et le lymphatique comme l'anémique se trouveront fort bien, de sa consommation. Il excite la salivation et, de ce fait, facilite la digestion.

**Epinards.** — La cure d'épinards contre la constipation habituelle — rien que des épinards, du pain et de l'eau... — est d'une efficacité remarquable. Ce légume est aussi particulièrement bienfaisant chez les dyspeptiques par manque d'acidité ou atonie des voies digestives. Seuls, les arthritiques s'en abstiendront par suite de sa forte teneur en acide oxalique.

**Fève.** — C'est la plus azotée des légumineuses et la moins riche en sucre. Brillat-Savarin l'appelait le « manger des dieux ». C'est peut-être exagéré; mais il n'en est pas moins vrai que l'infusion de ses fleurs et de ses cosses possède des vertus thérapeutiques jadis insoupçonnées contre l'inflammation des voies urinaires.

**Haricot.** — Le haricot frais, même non débarrassé de son épiderme (flageolet, soissons, haricot-riz, etc.), peut être recommandé à tous, voire (contrairement à la légende), aux dyspeptiques, à condition d'être associé au haricot vert (hari-

cots panachés) et accompagné d'herbes aromatiques finement hachées. Sec, il fera de préférence de succulentes purées.

Le haricot vert se classe dans la catégorie des légumes aqueux, c'est-à-dire contenant une très forte proportion d'eau. Certains hygiénistes le prétendent nocif aux arthritiques, mais rien ne vient prouver cette assertion, et, cuit à l'étuvée, puis absorbé soit à l'anglaise, soit en salade, il n'a jamais fait de mal à personne. Il faut noter toutefois qu'il est, étant « nouveau », très peu nutritif. Cependant la cellulose qu'il contient en grande quantité accroît le volume du bol alimentaire et facilite dans une certaine mesure son évacuation.

Le haricot mange-tout sert de transition entre le haricot vert et le haricot en grain. Il possède les qualités des deux autres, et, en plus, il est léger, rafraîchissant et relativement nourrissant.

Reste le haricot en grain, qui a la réputation d'être difficile à digérer; c'est là une exagération. Le reproche s'adresse surtout aux grains secs, non décortiqués, du haricot rouge ou noir. Consommé frais, il peut être recommandé à tous, à condition qu'il soit bien mâché. Et comme les lentilles, il est excellent pour ceux qui fournissent un gros travail musculaire.

**Navet.** — Ce plat mérite de paraître plus souvent sur notre table. La feuille tendre des jeunes navets, mangée crue en salade, est un excellent dépuratif printanier. L'hiver, le jus de navet, mélangé à du miel, représente un bon pectoral en cas de rhumes, grippes et bronchites. En outre, la magnésie et l'arsenic que contient le navet sont très utiles contre l'entérite et l'arthritisme.

**Oignon.** — Certes, l'oignon cru irrite nos yeux et rend notre haleine peu poétique... mais pardonnons-lui en raison de ses bons *et* loyaux services. Absorbé cru, il s'affirme un diurétique supérieur, et, d'autre part, il désinfecte l'air des chambres de malades.

**Oseille.** — Son acidité prononcée fait déconseiller l'oseille à la même catégorie de malades (arthritiques, rhumatisants) à qui, déjà, sont interdits les épinards. Mais, tout comme les épinards, l'oseille favorise l'exonération des voies digestives.

**Poireau.** — C'est « l'asperge du pauvre », selon Juvénal. Ingrédient le plus savoureux du bouillon de légumes, il se prête en outre à la confection de différents mets fournissant un aliment de digestion facile aux dyspeptiques, aux artérioscléreux et aux obèses.

Il est antiseptique, calme les inflammations et lutte efficacement contre la constipation. Il est excellent contre les fermentations et putréfactions intestinales, surtout lorsqu'il est employé cru, haché très menu. C'est un aliment vitalisant qui, par un processus encore ignoré, fournit un appoint considérable d'énergie, principalement lorsqu'il n'est pas cuit.

**Pois.** — Il y a les frais, qu'on nomme petits pois, et les secs, qui sont dits pois cassés. Dans les deux cas, c'est un aliment très nutritif, davantage que la viande. Les pois sont donc surtout indiqués pour les travailleurs manuels, ceux de la ville comme ceux des champs, et pour les sportifs. Les sédentaires, ceux qui travaillent dans les bureaux, n'effectuant pas trop d'efforts, doivent n'en user que modérément.

Dans l'établissement des menus, il faut se garder de prendre les petits pois frais comme des légumes, surtout lorsqu'il s'agit d'un régime; on se tromperait lourdement. Le pois est comparable à la lentille, au haricot ou à la fève.

Il n'en est pas de même du pois mange-tout, qui contient beaucoup d'eau et dont on peut consommer sans aucune restriction.

Le petit pois de printemps constitue une « primeur » de

choix. C'est à ce moment que, moins chargé de principes nutritifs, plus sucré et plus tendre, il se recommande par là finesse de sa saveur et par sa digestibilité. Accommodé à l'anglaise (bouilli à l'eau et servi avec du beurre non cuit), il est toléré par les tempéraments les plus difficiles.

**Pomme de terre.** — Gloire éternelle de Parmentier, la pomme de terre doit à la complaisance avec laquelle elle s'associe aux autres substances nutritives, à la propriété qu'elle possède de se métamorphoser suivant le mode de cuisson, le privilège de fournir une grande variété de combinaisons culinaires, répondant à toutes les exigences *de* la diététique et de la gastronomie. Pour les diabétiques, elle se substituera avantageusement au pain, si elle cuit au four ou à l'étuvée.

Pour les arthritiques, la pomme de terre est presque un remède, car elle contribue à rétablir l'équilibre des humeurs. Volumineuse mais peu nutritive, elle est indiquée pour tous les gros mangeurs, pour les obèses, et en général, pour ceux et celles qui veulent conserver leur ligne.

Un petit conseil : quand vous mangez des purées, mastiquezles comme s'il s'agissait d'un produit solide, afin de les bien mélanger de salive; sinon vous souffrirez de fermentations.

Cuite au four, sous la cendre ou à l'étuvée, elle remplace avantageusement le pain pour ceux auxquels celui-ci est défendu. Ingérée à raison de I kilogramme par jour environ elle permet des cures remarquables, une amélioration de l'état général et, chez les opérés, une cicatrisation très rapide. Consommée crue, finement râpée, par exemple, comme on le ferait pour du fromage, elle combat puissamment le scorbut.

Radis. — Se doute-t-on que le radis, le petit radis rose, râpé, dont on exprime la pulpe dans un linge, fournit un liquide qui, consommé frais, procure des améliorations incontestables dans certains cas de maladies chroniques du foie, en favorisant la diurèse et l'évacuation de la vésicule biliaire ? Telle est pourtant, la récente découverte d'un grand spécialiste allemand.

**Salades.** — Les salades, toutes les salades consommées crues, sont des « vitaminants » de première force. Ce sont surtout, contrairement au préjugé courant, les feuilles vertes qu'il s'agit d'absorber. Toutes sont d'ailleurs, en règle générale, les amies de l'intestin, par leurs qualités mucilagineuses. Cuites, la plupart des salades témoignent de vertus rafraîchissantes non négligeables. Les laitues, crues ou cuites, sont un aliment idéal pour les nerveux. Consommées au repas du soir, elles calment les anxieux et apportent le sommeil. Pilées crues, elles fournissent un liquide qui, mélangé avec moitié de leur poids d'eau et chauffé lentement jusqu'à réduction d'un tiers, fait merveille dans les crises de goutte.

La mâche est tout indiquée pour les névrosés, les excités et les constipés.

Le pissenlit devrait être recommandé à tous les déficients du foie, dont il calme les crises douloureuses.

La rhubarbe a des propriétés purgatives bien connues.

**Salsifis.** — C'est un des végétaux les plus faciles à digérer fort savoureux, à l'eau, au jus, à la maître d'hôtel, à la sauce blanche, au beurre ou à la graisse. Et — détail quasi ignoré mais précieux — sa feuille mérite d'être classée parmi les salades les plus tendres et les plus fines.

Il n'est défendu qu'aux diabétiques. Pour tous les autres, il est à recommander, surtout aux faibles et aux convalescents. Pour les obèses et les artérioscléreux, le repas du soir peut être seulement composé d'un bol de bouillon de salsifis et d'un dessert léger.

Tomate. — Elle a droit à une éclatante réhabilitation; c'est

à tort qu'on l'a dite riche en oxalates, par conséquent néfaste aux rhumatisants et goutteux. Elle possède, au contraire, la propriété bienfaisante d'alcaliniser le sang; et de plus, elle recèle en abondance les trois vitamines A, B, C.

Elle ne devient acide que lorsqu'elle est cuite ou conservée, elle peut alors léser l'estomac. Mais il suffit d'incorporer un peu de farine au cours de la cuisson pour neutraliser cette acidité. Au lieu de boire un apéritif, mangez des tomates crues au début du repas; vous préparerez remarquablement les voies digestives aux mets suivants.

Ultime recommandation : ne consommez que des tomates bien mûres.

Ce n'est là qu'un résumé bien bref et bien incomplet des avantages que trouveront tous nos contemporains à consommer force légumes et, si possible même, rien que des légumes... Car, comme le dit excellemment le docteur Leclerc : « Les végétaux qui croissent en abondance dans notre pays n'ont pas besoin d'avoir été transformés en muscles, en sang et en viscères par la patiente rumination des boeufs et des moutons, par la gloutonnerie des porcs, par les coups de bec de la gent empennée des basses-cours, pour fournir une alimentation adaptée à toutes les exigences de notre organisme. »

Il y a plus de trois siècles, Oswald Crollius émettait cet adage : « Nous voyons que ceux qui guérissent avec des simples ont plus d'heur et plus d'honneur au succès de leurs entreprises que les autres. »

La phytothérapie, ou cure par les plantes, remonte d'ailleurs à la plus haute antiquité. Nos ancêtres de la préhistoire ne connaissaient pas d'autres médicaments. Il ne faut pas médire des « remèdes de bonne femme », car les progrès de la pharmacopée et de la chimie — avec la découverte des alcaloïdes, et des glucosides, par exemple — n'ont fait que confirmer la valeur médicinale de certaines plantes, herbes et fleurs dont l'expérience populaire avait, depuis des millénaires, reconnu empiriquement les bienfaits.

Tous ceux qui ont à la campagne une maison, un jardin, tous ceux qui aiment cultiver ou herboriser, doivent connaître les propriétés diverses et souvent remarquables de la médecine des simples. Ils en trouveront ci-dessous, condensé, l'essentiel, éclairé, confirmé par les plus récentes études de laboratoire.



## **FLEURS**

**Belle-de-nuit.** — Ses fleurs, en clochettes, sont semblables celles du liseron. Mais c'est sa racine qui est employée en thérapeutique. A la dose de 2 à 5 grammes pour un verre d'eau sucrée, elle constitue un excellent et économique purgatif.

Campanule. — Cette herbacée très répandue est renommée pour la destruction des verrues. On écrase les feuilles, dont on fait ensuite un emplâtre sur les excroissances de chair à faire disparaître. A noter d'autre part que la racine de campanule, épaisse et rafraîchissante, constitue un bon aliment, trop peu employé.

**Capucine.** — Cette belle plante grimpante originaire du Pérou est d'une odeur vive et pénétrante; sa saveur, chaude, présente une certaine analogie avec celle du cresson. Les fruits de la capucine, séchés et réduits en poudre, forment un excellent purgatif, qui a l'avantage de ne donner aucune colique. On le prend dans un liquide quelconque, à la dose de 50 à 60 grammes.

Son suc et son alcoolature fournissent des résultats contre

la bronchite chronique et l'emphysème. Mais c'est surtout comme tonique du cuir chevelu qu'il faut apprécier la capucine. Ses feuilles et semences fraîches mélangées à des feuilles fraîches d'ortie et de buis, hachées et macérées dans de l'alcool à 90°, constituent une lotion qui combat efficacement la chute des cheveux et stimule la vitalité du bulbe pileux.

Enfin, la capucine passe pour antiscorbutique et antiscrofu-

Centaurée. — C'est « l'herbe au centaure », connue dès la plus haute antiquité. Tonique amer, il entre dans la préparation de certains apéritifs, comme les vermouths. Et il réveille, en effet, les fonctions motrices et sécrétoires des voies digestives. On l'emploie en infusion à la dose de 30 grammes par litre d'eau; à 60 grammes par litre de vin, il constitue une préparation très active, et restitue des forces aux convalescents et aux anémiques, il calme, en outre, certaines douleurs d'estomac qui s'accompagnent de fermentations. Et sous son action, souvent la fièvre cède.

**Coquelicot.** — Les pétales de coquelicot entrent dans la préparation du mélange dit « fleurs pectorales », employées, comme on le sait, contre les affections des voies respiratoires.

Cette thérapeutique est anodine dans toute l'acception du mot : une pincée de feuilles sèches par tasse d'eau bouillante sera infiniment préférable aux préparations à base d'opium pour calmer la toux et dompter l'insomnie chez certains individus fragiles : enfants, vieillards, malades, convalescents.

**Giroflée.**— Une infusion de ces fleurs représente un calmant nerveux et un diurétique; quant à ses semences, elles combattent avantageusement diarrhées et dysenteries.

Lin. — La légende rapporte que ce fut la déesse Isis qui enseigna aux Egyptiens à tisser ce délicat végétal, dont nous continuons à confectionner une toile toujours aussi estimée. Mais c'est la farine de ses graines dont la thérapeutique domestique fait un usage séculaire sous forme de cataplasmes, cette bouillie émolliente constitue en effet un topique sans rival. Employées en décoctions, ces graines sont rafraîchissantes et trouvent leur emploi partout où il y a inflammation, principalement dans les maladies des voies urinaires. Ces mêmes graines, absorbées comme celles du psyllium, représentent un déconstipant doux et efficace.

**Pourpier.** — Cette plante potagère très cultivée dans les jardins n'ouvre ses fleurs que le matin, sous l'influence de la lumière solaire. Elle a joué jadis le rôle d'une véritable panacée; on se contente maintenant de le considérer comme un médicament mucilagineux et émollient; il est aussi vermifuge, comme l'ail, et n'a pas l'inconvénient de se trahir par l'indiscrète haleine de ceux qui l'ont absorbé...

**Ricin.** — Cette plante aux grandes feuilles palmées peut atteindre 3 mètres de hauteur. Ses graines renferment par moitié une huile très visqueuse, presque incolore, inodore, insipide et dont il n'est sans doute personne qui n'ait eu à expérimenter l'action purgative. On signalera utilement, à ce propos, que les doses d'ordinaire prescrites, de 40 à **50** grammes et même davantage, dépassent notablement le but cherché : 20 grammes suffisent amplement pour obtenir le même résultat.

Rose. — « Ce que nous nommons une rose — disait Shakespeare — aurait une senteur tout aussi enivrante si nous l'appelions de tout autre nom. » Mais le rosier ne donne pas que ses fleurs au parfum si suave qu'aucun autre ne saurait lui être comparé; les boutons de rose, qu'on récolte au mois de mai, desséchés à l'ombre et administrés en infusion, ont une réelle valeur astringente. **Sauge.** — Voilà encore une plante aux multiples emplois thérapeutiques... Que ne lui attribue-t-on pas! et, ma foi, souvent non sans de valables raisons. La sauge étant toujours verte, on peut l'employer en toutes saisons dans cet état.

Sa principale caractéristique est de s'opposer aux sueurs nocturnes et profuses des fièvres des tuberculeux, des convalescents et des débiles; on recommande dans ce cas son infusion dans le vin ou l'alcool. La décoction dans du vin, de la bière ou de l'eau s'emploie pour le pansement d'ulcères ou de plaies difficiles à fermer. Dans l'asthme, les feuilles sèches fumées en guise de tabac soulagent les malades. Dans l'aphte des enfants, on trempe un pinceau dans ce liquide et on le touche, pour le faire disparaître en peu de temps. Enfin, on favorise la croissance des cheveux par des frictions en parties égales de teinture de sauge et de rhum.

**Scabieuse.** — Son extrait fluide, administré en potion, avec du sirop de tolu, rend de réels services comme expectorant, à la période du début des affections aiguës de l'appareil respiratoire (bronchites, congestions pulmonaires, broncho-pneumonies). Quant à sa racine, macérée dans de l'eau-de-vie, elle donne une liqueur amère, estimée comme stomachique, apéritif et digestif.

**Souci.** — Les femmes névropathes et anémiques voient souvent leurs fonctions mensuelles déréglées. La teinture ou l'extrait de souci rétablira normalement le flux, tout en calmant les symptômes douloureux et les troubles réflexes. En usage externe, le souci, sous forme, également, de teinture ou bien d'alcoolature étendue d'eau, fournit un excellent topique pour le pansement des plaies, des engelures ulcérées et des brûlures.

Violette. — Toutes les parties de cette modeste mais charmante fleurette de printemps : fleur, feuilles et racines, sont utilisées en thérapeutique. Les anciens lui attribuaient le pouvoir de dissiper l'ivresse; aussi s'en ceignaient-ils le front dans les festins. La médecine moderne lui reconnaît d'autres vertus plus vraisemblables et plus opérantes : les feuilles cuites dans un peu d'eau sont utilisées en cataplasmes calmants; les pétales frais, en infusions sucrées (12 heures de séjour dans l'eau) s'emploient avec succès dans les bronchites, catarrhes chroniques et maux de gorge; enfin, la racine, coupée en morceaux et bouillie, constitue un vomitif de choix.

Voici donc, sommairement examinées, quelques-unes des plantes potagères et des fleurs les plus communément cultivées à la campagne. Nous n'avons certes pas eu d'autre ambition que de donner une idée approximative des qualités et des vertus de ces « simples » champêtres, si estimés jadis, et souvent trop dédaignés aujourd'hui. Mais il va sans dire que, quelque efficaces que soient certaines plantes, elles ne sauraient se substituer dans tous les cas à des traitements médicaux complets. Dès les premiers malaises, le recours au médecin continue à être de règle... Vous verrez d'ailleurs que souvent l'homme de l'art sera le premier à vous recommander de recourir à des doses prescrites de plantes ou de fleurs ; sa science, ainsi, rendra hommage à l'éternelle et bienfaisante nature...

N. B. — Ces quelques mots n'ont pas d'autre but que de donner des indications sommaires sur les propriétés thérapeutiques et hygiéniques des plantes potagères et des fleurs fort connues et à la portée de tous ceux qui ont un jardin. Il est spécialement recommandé de ne traiter aucun malaise, aucune maladie sans consulter son médecin, de ne proposer aucun remède sans s'en remettre à un pharmacien ou herboriste.



#### **BASSE-COUR ET JARDIN**

Qui ne se rappelle avoir vu quelquefois la ménagère, toutes jupes retroussées, les bras en l'air invoquant, au milieu de ses cris, les saints et Dieu, se précipiter vers son jardin dont la porte, légèrement entrouverte, avait livré passage à une couvée de jeunes poulets, flanqués de leur mère! Ce n'est certes pas par hasard que celle-ci a amené sa progéniture dans ce lieu de prédilection : son instinct l'a poussée, avec beaucoup de sûreté, là où sa petite famille, abandonnant la fade pâtée quotidienne, pourrait, tout à loisir, se gaver de verdure, pour le plus grand bien de sa croissance, de son estomac et de sa digestion. Ces petits envahisseurs d'une heure auraient tôt fait de raser toutes les cultures du jardin, et se retireraient satisfaits, laissant la terre à nu, si l'on n'y mettait rapidement bon ordre. De cette avidité naturelle à tous les animaux de la basse-cour pour tout ce qui est verdure, pour tout ce qui pousse dans nos jardins, on peut déduire qu'il est facile, à la campagne, sans quitter son occupation principale, de faire un petit élevage en poules, canards, dindes, oies et lapins, sans que ce soit une chose onéreuse, et que l'on peut, si l'on ne voit pas trop grand, mettre tous les dimanches la poule au pot, ainsi que le désirait notre bon roi Henri, et même de temps à autre accroître ses revenus, en vendant quelques produits d'un élevage bien pratiqué.

Le cadre forcément restreint de notre « Guide », et le but que nous avons en vue, ne nous permettent pas de nous étendre bien longuement sur l'alimentation idéale de la basse-cour; cette alimentation, au surplus toute théorique, n'a rien d'absolu, et il est démontré que, dans ce domaine, comme d'ailleurs dans d'autres, le bon sens justement vanté de nos ménagères vaut beaucoup mieux et arrive à des résultats souvent supérieurs à ceux que l'on obtient par l'application stricte d'une théorie, fût-elle excellente.

Il est admis cependant que les principaux éléments constitutifs des aliments sont : les matières azotées ou albuminoides ou protéiques, qui sont la base essentielle de l'organisme; les matières grasses, qui favorisent la formation de la viande; les matières hydrocarbonées ou hydrates de carbone qui, chez l'animal, se transforment en graisse; la cellulose qui supplée à l'insuffisance de matières hydrocarbonées et dont la composition se rapproche de l'amidon; et les cendres éminemment favorables au squelette et à l'oeuf (potasse, acide phosphorique, chaux, magnésie). Laissons de côté les principales matières que les animaux de la basse-cour trouvent dans le grain, ou

ALIMENTS CONTENANT DES ÉLÉMENTS NUTRITIFS	MATIÈRES			m	, s
	AZOTÉES	GRASSES	HYDRO- CARBONES	CELLULOSE	MATIÈRES MINÉRALES
Graines :					
Pois Féveroles Vesces Lentilles	23.1 25.3 26.2 25.4	4.9 1.9 2.1 1.9	52.7 48.3 49 52.5	5.6 8.1 6.6 4.4	2.7 3.1 2.7 3.
Racines :					
Pommes de terre Topinambours Carottes Navets Betteraves	2.1 2 1.3 0.9 1.2	0.3 0.5 0.2 0.1	20.7   <b>4.9</b>   9.6   6   8.9	1.1 1.6 1.9 0.8	3.77 4.88 0.8 0.7 I.
Feuilles en vert :					
Choux cavalier . Carottes Betteraves Topinambours . Luzerne Trèfle Gazon	2.5 3.5 2.5 2.9 3.5 3.7 2.6	0.7 0.8 0.4 0.8 0.7 0.6	7.1   7.8   4.7   7.8   7.8   6.5   12.8	2.4 3.7 1.7 5.7 8.3 2.9	1.6 4.8 2 4.8 1.7 1.4 2

en picorant, et voyons, pour rester dans le cadre forcément li mité de notre sujet, la composition de ce que les volailles peuvent trouver dans nos cultures habituelles.

On voit, par le tableau ci-dessus, combien il est facile de se procurer, même dans une petite exploitation, d'excellents aliments et à très bon compte. Il faut cependant que l'alimentation soit, non seulement suffisamment riche en matières nutritives, mais encore qu'elle présente un certain volume pour que l'estomac des volailles soit bien garni et que la faim soit apaisée; c'est dans ce cas que rendent de grands services les pommes de terre et la verdure, qui, une fois cuites, sont très digestibles. Pour bien produire, il est nécessaire que les volailles digèrent rápidement, et cette remarque est encore plus importante pour l'élevage des petits poulets, où le but de l'éleveur est de stimuler l'appétit de ses sujets afin de les faire manger davantage pour les amener plus rapidement soit sur la table, soit au marché.

Le premier aliment qui se présente à nous, le plus populaire, est la pomme de terre récoltée partout; c'est un aliment excessivement précieux dans une basse-cour, car, mélangée ou non à des tourteaux et surtout à des aliments animalisés, elle est profitable aussi bien aux jeunes bêtes qu'aux volailles adultes. Mélangée aussi au maïs concassé, elle a une chair particulièrement fine. On peut faire cuire maïs et pomme de terre ensemble jusqu'à ce que les pommes de terre s'écrasent d'elles-mêmes, et l'on donne cette pâtée quinze jours ou trois semaines avant de manger la volaille, en y mélangeant une petite quantité d'orties pour activer l'appétit. C'est là une recette peu coûteuse pour faire un poulet excessivement fin. En y mélangeant du petit-lait, on arrive à un résultat encore supérieur.

Le topinambour vient, comme plante-racine, immédiatement après la pomme de terre; c'est un aliment que les volailles prennent bien, quand il est cuit. On l'utilise de la même façon que les pommes de terre.

La carotte est parfois prise crue par les poules, découpée en petits morceaux. C'est un aliment excellent pour les poules tenues dans des parquets étroits et ayant par conséquent des tendances à l'engraissement exagéré. Elle empêche aussi la dégénérescence graisseuse du foie. Cuite et mélangée aux pâtes farineuses, elle contribuera à former un très bon aliment. On prétend que la carotte donne un goût très fin au lait de vache quand elle n'est pas donnée en excès, et il n'y a pas de raison pour qu'il n'en soit pas de même pour la chair des volailles et leurs œufs.

Le navet est surtout employé cuit dans la nourriture des canards et des oies; il est très aqueux.

Avec la betterave, nous revenons à un aliment très apprécié des poules, qui les pousse très rapidement à l'engraissement. Les poules mangent parfaitement la betterave blanche, crue et découpée en petits morceaux. Si on la leur donne en gros cubes, elles la creuseront jusqu'à ce qu'il ne reste plus que la peau. C'est un aliment très sain et qui est très économique. Elle est un excellent complément de la nourriture de pommes de terre et maïs. Comme la betterave n'est pas excellente pour la ponte, il vaut mieux la réserver pour l'engraissement des petits poulets, ou comme aliment rafraîchissant d'été.

Après les racines, il convient de s'arrêter un instant aux feuilles de ces mêmes plantes; les feuilles de pommes de terre ne sont pas prises par les poules, mais celles des topinambours, très riches en principes nutritifs, sont goûtées des volailles. Les fanes de carottes ne sont pas l'objet d'une faveur spéciale des poules, encore qu'elles soient très nutritives; en les mélangeant avec de la pâtée, de façon très menue, on peut en tirer parti.

Les feuilles de betterave blanche sont très bien acceptées par les volailles, et elles possèdent de grandes qualités rafraîchissantes et nutritives. Il convient cependant de les donner en quantité modérée.

Nous arrivons enfin aux verdures proprement dites, qui sont tellement indispensables que l'on pourra fort utilement sacrifier quelques ares de terrain pour satisfaire au besoin d'alimentation herbacée qu'éprouvent toutes les volailles. Il est incontestable que, pour tenir la basse-cour en bonne santé, rafraîchir le sang et arrêter les maladies de foie qui se déclarent quand elle est nourrie trop abondamment et tenue dans un espace trop restreint, il est nécessaire de lui fournir de la verdure en abondance. Le régime du vert combat très efficacement les engorgements du foie et sa dégénérescence graisseuse des volailles trop nourries et trop grasses, chez lesquelles la bile ne se déverse plus dans l'appareil digestif que dans de trop faibles proportions.

C'est vers la fin de l'automne et en hiver que l'on se trouve le plus privé de verdure, mais certaines espèces de choux présentent une ressource inépuisable quand on sait s'organiser. Le grand chou cavalier est précieux à cet effet, il résiste fort bien à la gelée, et fournit dès le mois d'août jusqu'au printemps une abondante provision de verdure. Une plantation bien entretenue peut durer deux ans; on espace suffisamment les prêds pour qu'ils puissent se développer et donner de très nombreuses feuilles. Semés en mars ou avril en pépinières, les choux sont repiqués en mai et peuvent être laissés définitivement en place.

Le chou de Vaugirard est aussi un bon chou d'hiver; on le sème en mai-juin pour le repiquer en place en juillet; nous donnons cependant la préférence au chou cavalier et au branchu du Poitou, d'une durée beaucoup plus longue et de récolte si rapide. Le chou a aussi un avantage qu'il est seul à posséder. et qui est particulièrement intéressant au moment de la mue de la volaille; par une alimentation appropriée, il est facile de permettre au cheptel de traverser presque sans s'en apercevoir cette période de crise qu'est la mue. Il entre dans la composition de la plume, comme éléments particuliers, du soufre et du phosphore; c'est donc cela qu'il faut ajouter à la pâtée. Pour le soufre, la fleur de soufre se mélange facilement. aux aliments, mais nous avons un élément de choix avec le chou, qui contient du soufre assimilable alors que la fleur de soufre l'est très peu. Quant au phosphore, nous le demanderons aux phosphates.

Les verdures qui sont ensuite le plus profitables aux volailles sont la chicorée sauvage et l'oseille. Il est à remarquer que l'oseille contient une certaine proportion de calcaire, et que sa distribution aux poules augmente la dureté de la coquille des oeufs. Quand les poules trop grasses pondent des oeufs « hardes », c'est une excellente mesure que de faire d'abondantes distributions d'oseille.

L'éleveur qui continuera la distribution régulière des trois verdures ci-dessus sera certain d'avoir toujours des volailles en bonne santé.

Nous devons enfin une mention particulière à l'ortie, que l'on n'a guère besoin de cultiver, puisqu'on la rencontre un peu partout; elle rend les poules plus vigoureuses. Il ne faut cependant pas exagérer, car l'ortie, très astringente, peut donner des inflammations de l'oviducte, ce qui a pour résultat de voir des œufs imprégnés de sang. Il n'est pas possible de réussir rapidement l'élevage des canards et des oies, sans ortie. La tétragone, succédané de l'épinard, les salades qui ne demandent que des soins culturaux très restreints, sont aussi excellents pour les volailles.

Enfin, dans les jardins, on aurait grand tort de jeter au fumier les gazons des pelouses, chaque fois qu'on les tond; c'est à la basse-cour que ces verdures doivent aller, ainsi que les sarclures du potager. Autant de choses qui ne coûtent rien, et qui sont appréciées des volailles.

#### LE CHEPTEL

Nous jugerions notre tâche incomplète si, après avoir indiqué quelques renseignements sur la façon de donner une bonne alimentation, tirée en grande partie du jardin, nous ne nous étendions pas sur le cheptel appelé, soit à nous donner quelque bénéfice, soit à nous procurer quelques « jouissances de gueule»

ainsi que les appelait Montaigne. Et c'est pour répondre à la question souvent posée : Quelle race de poules doit-on élever ! que, laissant de côté les classifications plus ou moins scientifiques, nous diviserons les volailles en races de rapport et en races d'agrément, donnant sur chacune des explications assez brèves.

#### RACES DE RAPPORT

Elles comprennent les volailles d'utilité générale, celles que l'on peut qualifier du titre glorieux de bonnes à tout faire. Ce sont les races communes, les humbles poules, les poules des humbles, plus précieuses mille fois à nos yeux que celles des races réputées les plus rares. Parmi elles, la poule de Houdan, dont le volume de la chair, la blancheur et la finesse sont extrêmes, et dont la ponte est de 150 œufs environ par an; la poule de Crèvecœur et de Caumont, de chair excellente, très facile à engraisser, mais qui, en dehors d'un climat humide, ne vient pas bien, en particulier, dans le Sud-Est de la France, où la chaleur est trop forte, elle ne donne pas de très bons résultats; la poule de Bresse, classée surtout parmi les volailles de table, en raison de la finesse exceptionnelle de la chair, moelleuse et blanche, de sa peau fine et savoureuse,

excellente pondeuse en toute saison, mais couveuse très médiocre; la race de Barbezieux, superbe volaille, de taille très élevée, réputée pour sa chair et le volume de ses œufs, surnommée la Bresse des Charentes; la race Orpington, d'origine anglaise, avec ses très nombreuses variétés : fauve, noire, blanche, fauve et blanche à crête plate, pailletée ;Jubilée, elle est volumineuse, alerte, chercheuse, rustique, très apte à chercher sa nourriture en liberté; la race Plymouthrock, d'Amérique, aux pattes jaunes, à la chair blanche, infiniment supérieure à celle des poulets du Midi; enfin, la race Wyandotte, qu'elle soit argentée, blanche, dorée, coucou, fauve ou noire, aussi bonne que belle, excellente volaille de ferme pouvant convenir à tous.

Autant de races qui font les belles basses-cours.

#### **RACES DE TABLE**

Leurs caractères sont les suivants : port élevé, allure trapue, sans exclure l'élégance des lignes; poitrine proéminente, large et profonde, cuisses courtes et couvertes, peau fine, blanche

ou rosée. Les races principales sont celles de La Flèche, ou du Mans, la race des Faverolles, pondeuse très moyenne, la race Dorking dont les petits se développent très vite.

#### **RACES POUR LA PONTE**

Elles sont d'ordinaire peu couveuses, et la qualité de leur chair est généralement inférieure. Elles sont plus sauvages que les autres, avec un plumage abondant sur un cou long et arqué, les cuisses fortes, les tarses nus, de couleur foncée ou jaune. Les meilleures sont sans contredit les Leghorn. Ce sont les reines des pondeuses, gracieuses, aux pattes jaunes. au plumage d'or, d'encre ou de neige. Placée dans des conditions favorables, elle pond sans interruption, en toutes saisons. En plein rendement, elle ne donne pas moins de 200 oeufs

par an, très blancs, très gros, d'un poids moyen supérieur souvent à 70 grammes. D'un tel oiseau fabriqué pour la ponte, on ne peut exiger une chair parfaite, ces deux qualités étant à peu près inconciliables. La chair reste médiocre, sans grande saveur et prend difficilement l'engraissement. Elle n'est ni couveuse, ni bonne mère; les poussins se développent rapidement, et sont des reproducteurs précoces, donnant des œufs parfois à quatre mois.

Une ponte régulière est toujours de bon rapport.

#### RACES D'AGRÉMENT

Les principales sont la race Sultane, les cous nus de Transylvanie, les Brahma, les Cochinchinoises, et les races naines qui font la joie des enfants.

Nous croyons de notre devoir de dire de la façon la plus nette aux lecteurs de notre « Guide », qu'une moyenne de 130 oeufs par an est nécessaire pour qu'un profit apparaisse, car il faut 70 oeufs environ pour couvrir les frais de nourriture d'une pondeuse pendant une année. C'est là un minimum très strict en dessous duquel il ne faut pas descendre si l'on ne veut pas avoir de mécomptes dans la basse-cour. Ajoutons aussi que c'est le coq qui transmet la faculté de ponte, et qu'il faut savoir le choisir.

Enfin, il convient de nettoyer aussi le poulailler comme on nettoie la vacherie ou la porcherie; trop souvent, on oublie de le faire, sans se rendre compte que la poule doit vivre dans

les meilleures conditions possibles d'hygiène. Il est nécessaire de donner aux poules de l'air, de la lumière, un couvert suffisant pour l'hiver, et aussi un local très sec, l'humidité, et l'humidité aux pattes notamment, étant ce que redoutent le plus les poules, et ce qui supprime radicalement la ponte.

Avec les renseignements que nous avons donnés, nous croyons pouvoir affirmer que nos ménagères n'auront pas de mécomptes dans leur élevage, et qu'elles pourront éviter, par une hygiène ainsi comprise, les principales maladies des poules : tuberculose, diphtérie, paratuberculose, coryza contagieux, peste aviaire, choléra, diarrhée bacillaire ou diarrhée coccidienne, s'attaquant principalement aux poussins, et contre lesquelles les meilleurs remèdes sont encore le crésyl, l'eau de Javel ou la chaux, dont on badigeonne les poulaillers à intervalles assez rapprochés.

# **LE DINDON**

L'élevage du dindon est très rémunérateur, mais ne réussit taire. Il est vagabond et difficile à garder en terrain clos. Sa

chair est extrêmement fine et délicate, et les petits se vendent pas partout. Il lui faut un sol sablonneux, granitique ou cal- 🚶 à six ou huit mois environ. Les dindonneaux sont d'un élevage assez délicat jusqu'au moment où les caroncules ont poussé.

## LA PINTADE

Dédaigneuse du poulailler, que souvent elle ne réintègre pas le soir, la pintade est un oiseau à demi-sauvage, à la chair de haute saveur, moitié volaille, moitié gibier. Elle est très

recherchée sur les marchés, et son élevage, très productif, mérite de retenir l'attention de nos fermières. L'élevage de la pintade s'est répandu dans plusieurs départements.

#### **LE CANARD**

Des divers hôtes de la basse-cour, le canard est celui dont l'élevage est le plus rapide et le plus facile. Il est réfractaire à la plupart des maladies et on peut le vendre à partir de trois mois.

C'est un très gros mangeur; mais, comme il est peu difficile sur la qualité, son élevage est toujours très lucratif. Il sera très utile à la ménagère, car il se charge d'avaler très facilement tous les escargots et toutes les limaces qui font tant de dégâts dans les plantations. C'est un oiseau aquatique, auquel cependant une grande quantité d'eau n'est pas nécessaire. Il

sait se contenter de barboter dans une mare, un trou ou un fossé. Il leur est nécessaire, aux moments de la fécondation, de faire cependant des promenades sur l'eau.

Les principales races de canards sont le canard de **Rouen**, recommandable par ses qualités de précocité, le canard de **Pékin**; le canard de **Barbarie**, appelé aussi canard d'Inde, n'a pas une chair très fine, mais croisé avec une cane du pays, il donne comme produit le canard **mulard**, réputé pour la production du foie gras.

#### L'OIE

Il lui faut de grandes étendues, où elle peut pâturer à volonté. Elle mange beaucoup d'herbe dans les prairies, mais se contente aussi du gazon plus maigre du talus des chemins. Son grand poids, sa chair estimée, son aptitude merveilleuse à l'engraissement, permettent d'obtenir de volumineux foies

gras, et le prix élevé du duvet rend son élevage très productif. Les principales races sont l'oie grise de **Toulouse**, très répandue dans le Midi, l'oie **blanche** et l'oie **d'Embeden**, assez peu répandue en France.

#### LE PIGEON

Est surtout granivore, et fait de 7 à 9 couvées par an. Sa chair est excellente et se vend fort bien. Il faut citer les

races de **Montauban**, les pigeons **Mondain** et les pigeons **Romain**.

#### **LES LAPINS**

Il convient de s'étendre un peu plus longuement sur l'élevage des lapins, car c'est celui qui rapporte certainement le plus, étant donné le peu de capitaux que l'on doit engager, et le peu de travail que cela donne. La vente des lapins se fait toujours facilement, le lapin étant très prisé, et si l'on peut disposer de quelques ares de terrain, il est permis à tous d'arriver à de bons résultats.

Les principales races sont : le lapin **Nivard**, très petit; le **Bélier**, **très gros**; le **Géant des Flandres**, qui, ainsi que son nom l'indique, est de très grosse taille; il peut atteindre jusqu'à **I** 0 kilos, mais sa fécondité est des plus moyennes.

On choisira les sujets pour la reproduction avec une tête et des oreilles de grosseur moyenne, plutôt petites, avec un corps long, large, fortement musclé; l'œil doit être vif et brillant, il ne faudra les employer pour la reproduction qu'à l'âge d'un an, et s'en débarrasser vers six ans. Passé cet âge, ils reproduisent mal, et leur chair devient par trop dure et filandreuse. On peut mettre un mâle pour dix femelles environ, et on ne le laissera pas cohabiter continuellement avec les femelles. On a tort aussi de ne pas retirer la femelle du mâle, quand l'accouplement a eu lieu; on la remet avec ses petits dès l'acte passé.

La lapine porte de **28 à 35** jours; en moyenne donc 3 I jours. Il convient, pour réussir dans l'élevage, de s'entourer de certaines conditions d'hygiène, et de donner aux lapins des loges grandes, propres, bien éclairées, chaudes en hiver et fraîches l'été, dépourvues d'humidité. La lapine porte en moyenne six fois par an et peut donner, si elle est bien soignée, de 40 à 50 lapereaux dans l'année. On peut engraisser les lapins, mais il convient de ne commencer que vers l'âge de huit mois; plus tôt, le lapin attraperait de nombreuses indigestions.

Le lapin est sujet à certaines maladies que l'on évite par un minimum d'hygiène; il peut avoir la gale, la paralysie, l'hydropisie, la diarrhée, et, enfin, des indigestions.

Il faut aussi savoir tuer le lapin; on peut l'assommer à coups de bâton derrière la tête; mais cela abime la peau, à cause du sang qui s'entasse derrière la nuque; on peut le saigner, maison se heurte aux mêmes inconvénients; le m'eux est encore de lui luxer les vertèbres ou de l'asphyxier en lui faisant avaler un verre de bon alcool. C'est encore là un des meilleurs procédés, car l'alcool donne un très bon goût à la viande. La peau doit être conservée et tannée, s'il s'agit de lapins angora; elle a une valeur qui peut augmenter les revenus de l'élevage dans des proportions sensibles.

# CONCLUSION

Nous n'avons pas, dans les pages qui précèdent, la prétention d'avoir fait un cours complet d'élevage; là où plusieurs livres complets suffiraient à peine, nos modestes pages ne sauraient atteindre. Notre seul but a été de montrer comment, de façon facile, sans fatigues et sans grosses dépenses, on peut retirer de la basse-cour, avec l'aide du jardin, quelques avantages substantiels, tant en nature qu'en espèces.

Notre plus grand désir serait d'avoir réussi, même partiellement; après avoir donné par ailleurs tous les renseignements utiles sur la façon de cultiver le jardin, sur la façon d'en préparer les produits, nous avons estimé nécessaire d'en montrer toute l'utilité pour l'alimentation de la basse-cour.

Il nous serait agréable d'avoir ainsi, joignant l'utile à l'agréable, donné le goût de la terre à ceux qui, peut-être imprudemment, s'en seraient détournés, et jamais nous ne nous lasserons de leur dire, avec le grand poète latin Virgile, le plus ancien comme le plus incomparable chantre de la terre, de ses travaux, de sa richesse : « O fortunatos nimium sua si bons norint agricolas. » Trop heureux tes agriculteurs si, à leur valeur vraie, ils savaient apprécier leurs biens.



Nous avons lu, jeunes encore, en un livre où la fantaisie ne le cédait en rien à l'humour, l'histoire de ces deux Saints, depuis de nombreux siècles figés dans la pierre, qui, au-dessus du portail d'une vieille cathédrale, avaient fini par se prendre de querelle, et échangeaient, sous une forme académique, ainsi qu'il convenait à des personnes de leur qualité, des propos dépourvus d'aménité.

Ces mouvements de colère, dont, dans la légende, sont animés ceux auxquels toutes les vertus ont été dispensées, et qui, à nos yeux, sont les symboles de la perfection, ne sont pas évités aux humbles mortels ; à tous les moments de la vie, par le contact permanent avec ses semblables, des sautes d'humeur, des brouilles pourraient surgir, émanant de différences d'opinions dans le domaine de la politique ou de la philosophie; et encore, ne s'agit-il là que de choses abstraites ; à la campagne, où la propriété, bien de famille, chose sacrée, touche celle du voisin, il y a là matière d continuelles discussions, pour peu que les caractères soient vifs ou de mauvaise composition.

C'est pourquoi, toujours soucieux d'éclairer nos fidèles lecteurs, nos meilleurs amis, nous avons voulu, dans notre « Guide » leur donner quelques idées précises sur leurs droits, et aussi sur leurs obligations.

Nous nous sommes bien gardés de faire à leur usage un cours complet de droit, nous bornant seulement à mettre sous leurs yeux ce qu'ils doivent connaître dans leur intérêt; et, c'est aussi dans leur intérêt, que nous rappelons le vieil adage, que dans le pays de la saine raison où naquit Descartes, on ne devrait pas oublier:

« Un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. »

# LA PROPRIÉTÉ

La propriété, c'est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois et les règlements; c'est le droit de se servir de la chose pour tous les usages non contraires à la loi, le droit à tous les produits que la chose peut donner, le droit d'en tirer des revenus en la louant ou en la prêtant à des tiers, le droit d'en disposer, soit en la consommant, soit en l'aliénant. Elle est perpétuelle, en ce sens qu'elle ne cesse pas à la mort du propriétaire, mais se transmet à ses héritiers; elle ne s'éteint pas.

La propriété du sol comporte la propriété du « Dessus » et du « Dessous »; cela ne veut pas dire que la colonne d'air qui surplombe le sol est la propriété exclusive de son propriétaire; son droit se limite à la partie aérienne qui lui est nécessaire pour jouir tranquillement à l'abri des incursions d'autrui de son terrain, des constructions et plantations qui le couvrent, et qu'il a le droit de faire. Il peut donc s'opposer à la pose de fils aériens qui traverseraient son fonds, à l'exception des fils

de distribution d'énergie électrique, mais il ne peut, et cela se conçoit, empêcher des aéroplanes de survoler son fonds.

Le propriétaire du sol a le droit de faire des fouilles et les carrières et les gisements miniers lui appartiennent; le propriétaire du sol a le droit de les exploiter, et cela, seul. Cependant, comme les mines constituent une richesse collective et que leur morcellement entre les propriétaires du sol serait un obstacle à une exploitation rationnelle, il faut obtenir une concession que délivre le Conseil d'Etat.

Il existe certaines restrictions au droit de propriété établies soit dans l'intérêt général, telles que l'expropriation pour cause d'utilité publique, les réquisitions par temps de guerre, les restrictions concernant la hauteur des constructions, les réparations et démolitions d'immeubles menaçant ruine, restrictions qui sont toutes très connues; mais à côté de celles-là, en existent d'autres beaucoup plus importantes, sources de procès continuels, que nous tenons à signaler à nos lecteurs en attirant de façon toute particulière leur attention sur elles.

#### RESTRICTIONS LÉGALES TENANT AU VOISINAGE DES FONDS

Le voisinage impose aux propriétaires des fonds contigus, des limitations réciproques et nécessaires à leurs droits, destinées à en permettre l'exercice concurrent et à éviter des querelles. Nous allons sommairement signaler les principales de ces limitations.

Voici quelques-uns parmi les règlements élémentaires.

#### **DISTANCES A OBSERVER POUR LES PLANTATIONS ET CERTAINES CONSTRUCTIONS**

I° Plantations. — Pour éviter que les plantations ne nuisent au fonds voisin par leurs branches et leurs racines, il est prescrit de ne faire de plantations qu'à la distance imposée par les règlements particuliers de l'Administration, ou par les usages constants et reconnus. A défaut de ces règlements et usages, les règles suivantes doivent obligatoirement être observées :

Il n'est permis de planter des arbres, arbrisseaux et arbustes dont la hauteur dépasse deux mètres, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux propriétés, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations. En cas d'infraction, le voisin peut exiger que les plantations soient arrachées ou réduites à la hauteur prescrite.

**2º Cas où un mur sépare les fonds.** — Les restrictions qui précèdent ne s'appliquent pas quand un mur sépare les fonds. Si le mur est mitoyen, c'est-à-dire si le mur appartient aux deux propriétaires, chacun peut y appuyer des espaliers à condition qu'ils ne dépassent pas la crête du mur. S'il appartient exclusivement à un des deux propriétaires, celui-ci peut y appuyer des espaliers sous la même réserve, mais le voisin non propriétaire est tenu d'observer les distances prescrites.

3° Empiètement des branches et racines sur le fonds voisin. — Lorsque les branches avancent sur le fonds du voisin, celui-ci peut contraindre le propriétaire à les couper, quel que soit le temps écoulé, car c'est un droit imprescriptible. De plus les fruits tombés naturellement lui appartiennent. Si ce sont des racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, celui-ci a le droit de les couper lui-même à la ligne séparative.

**4° Constructions incommodes pour les voisins.** — Il est certaines précautions à prendre pour les puits, fosses d'aisances, cheminées, fours, étables. Comme ces installations se font rarement à la limite de la propriété, nous ne donnerons pas dans cette courte étude les distances à observer, car le sujet serait trop long à traiter et déborderait notre cadre. Des renseignements en cas de litige possible, peuvent être demandés à un avocat ou à un avoué.

**5° Ouvertures de vues.** — Si l'on a à faire à un mur mitoyen, aucun des deux copropriétaires du mur ne peut y pratiquer d'ouvertures de quelque manière que ce soit, même munies d'un châssis à verre dormant, c'est-à-dire ne pouvant pas s'ouvrir. En effet, chaque propriétaire a le droit de se servir du mur pour y appuyer des constructions ou des plantations, ce qui est incompatible avec l'existence d'ouvertures.

S'il s'agit d'un mur non mitoyen, dont on est le seul propriétaire, il convient de distinguer :

A) Dans les parties du mur qui joignent immédiatement le bien d'autrui, le propriétaire *ne* peut ouvrir que des jours de tolérance ou de souffrance, ce qui signifie des ouvertures à fer maillé et verre dormant, c'est-à-dire garnies d'un treillis de fil de fer dont les mailles ont un décimètre d'ouverture au plus, et en outre à 2 m. 60 au-dessus du plancher, si c'est au rez-de-chaussée, et à I m. 90 pour les étages supérieurs de telle façon qu'on ne puisse rien jeter, ni regarder sur le fonds voisin.

B) On ne peut ouvrir dans un mur de vues libres, c'est-à-dire des fenêtres pouvant s'ouvrir librement, qu'autant qu'il y a entre le parement extérieur de ce mur et la ligne séparative des deux fonds une certaine distance qui est de I m. 90 pour les fenêtres ouvertes dans une partie du mur parallèle au fonds du voisin, de sorte qu'en regardant par cette ouverture on plonge directement sur ce fonds, et de 0 m. 60 pour les ouvertures qui ne permettent de regarder sur ce fonds qu'en se penchant hors de la fenêtre soit à droite, soit à gauche. Ces vues obliques sont évidemment moins gênantes pour le voisin que les vues droites; c'est pourquoi la loi exige une moin ire distance.

Les dispositions qui précèdent s'appliquent à la campagne comme à la ville, au domaine privé de l'État comme aux biens des particuliers, mais ne s'appliquent pas aux murs bordant une voie publique, quand bien même ce serait une ruelle n'ayant pas I m. 90 de largeur. Et le propriétaire peut acquérir par un contrat ou une possession de trente ans le droit d'avoir sur le fonds voisin des vues à une distance moindre que celle prescrite par la loi.

# **OBLIGATIONS RÉSULTANT DU RÉGIME DES EAUX**

Le régime des eaux comporte certaines atteintes au libre usage du droit de propriété qui ont pour but de faciliter : I° l'écoulement des eaux; 2° l'irrigation et le drainage des terres

Les fonds inférieurs doivent recevoir les eaux qui découlent naturellement, sans que la main de l'homme y ait contribué, des fonds supérieurs. Cette obligation comporte non seulement le libre passage des eaux de pluie, mais encore des eaux de source. Le propriétaire inférieur ne peut élever de digue qui empêche cet écoulement; s'il veut construire un mur, il doit laisser l'ouverture nécessaire pour le passage des eaux. En revanche, la servitude ne s'applique pas aux eaux ménagères ou à l'égout des toits. Tout propriétaire doit établir

ses toits de telle façon que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique, mais pas chez le voisin.

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la charge imposée par la loi au fonds inférieur; il ne peut contaminer les eaux, et, si par des sondages ou des travaux souterrains, il obligeait le fonds inférieur à recevoir une plus grande quantité d'eau, il serait tenu à verser une indemnité.

Enfin, sont tenus aussi au versement d'une indemnité ceux qui, pour irriguer leurs terres, font sur la rive qui ne leur appartient pas des ouvrages nécessaires à la prise d'eau, ceux qui installent des aqueducs pour amener l'eau dans leurs terres, et ceux qui veulent drainer leurs terres et sont obligés de passer dans le domaine du voisin.

# DROIT DE PASSAGE EN CAS D'ENCLAVE

Un fonds est dit enclavé quand il n'a aucun accès à une voie publique, cas fréquent à la campagne du fait du morcellement des terres.

Pour permettre l'exploitation d'un fonds enclavé, la loi

donne au propriétaire le droit de passer sur les fonds qui le séparent de la voie publique, à charge d'en indemniser les propriétaires. Les règles sont les suivantes :

I° Pour qu'un fonds soit considéré comme enclavé, il faut

qu'il n'ait sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante pour son exploitation agricole ou industrielle.

2° Le passage doit être pris régulièrement, c'est-à-dire en général, du côté où le trajet est le plus court du fonds enclavé à la voie publique. 3° Le droit de passage est dû par les fonds intermédiaires même s'ils sont clos et attenants à une habitation.

4° Si le passage a été exercé pendant 30 ans sans qu'une indemnité ait été payée, l'action en indemnité est éteinte par la prescription.

#### **BORNAGE ET CLOTURE**

Le bornage est l'opération qui consiste à fixer les limites de deux propriétés contiguës et à placer des bornes ou autres signes de délimitation. Tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës, et le bornage se fait à frais communs. Cette opération a l'avantage de prévenir les contestations entre voisins.

Tout propriétaire peut clore son héritage; ce droit ne subit

d'exception qu'au cas de servitude de passage au profit d'un fonds enclavé; mais, en principe, un propriétaire ne peut obliger son voisin à établir une clôture à frais communs entre leurs biens. Il y a toutefois une exception : quand il s'agit de maisons, cours et jardins sis dans les villes ou les bourgs, l'un des voisins peut contraindre l'autre à construire à frais communs une clôture faisant séparation desdits fonds et à la réparer.

# MITOYENNETÉ DES CLOTURES

On dit qu'une clôture est mitoyenne quand elle appartient indivisément aux propriétaires des deux fonds qu'elle sépare. La mitoyenneté a le grand avantage de dispenser les propriétaires de faire les frais d'une double clôture et de perdre ainsi inutilement du terrain. Ainsi, quand deux propriétaires élèvent deux constructions contiguës, ils ne font qu'un seul mur de séparation et ce mur devient mitoyen. La mitoyenneté peut s'appliquer à toutes les clôtures, murs, fossés, haies, barrières en planches ou à claire-voie.

La mitoyenneté peut résulter d'un accord entre propriétaires, s'ils conviennent d'établir une clôture à frais communs, ou bien celui qui l'a établie peut céder à l'autre la mitoyenneté.

Quand un propriétaire a établi un mur joignant la limite de son fonds, le voisin peut le contraindre à lui en céder la mitoyenneté en tout ou en partie, en lui remboursant la moitié de la valeur du mur, avec la moitié de la valeur du sol sur lequel le mur a été bâti. (Cette règle ne s'applique qu'aux murs.) Le voisin devient copropriétaire du mur quand il s'en est servi pendant 30 ans pour son usage personnel.

Il peut arriver que deux voisins soient en désaccord sur la question de savoir si le mur qui les sépare est mitoyen. Si personne ne peut affirmer son droit, les présomptions sont les suivantes :

- A) Quand le mur sert de séparation entre deux bâtiments, il est présumé mitoyen jusqu'à la hauteur du toit du bâtiment le moins élevé, car il sert jusqu'à cette hauteur aux deux voisins
- B) Un mur est également présumé mitoyen quand il sert de séparation entre cours et jardins, mais non quand il sépare une cour ou un jardin d'une maison, car il y a lieu de penser qu'il appartient exclusivement au propriétaire de la maison.
- c) Quand il sert de séparation entre deux enclos dans les champs, le mur est encore présumé mitoyen.

#### DROITS ET OBLIGATIONS DES PROPRIÉTAIRES QUANT A LA CLOTURE MITOYENNE

Chaque copropriétaire a le droit de se servir de la face du mur qui regarde son héritage pour y appuyer des espaliers ou des constructions. A cet effet, il a le droit de placer des poutres dans le mur jusqu'à la moitié de son épaisseur.

Il peut aussi faire exhausser le mur mitoyen, mais il doit payer seul la dépense de l'exhaussement, les réparations d'entretien au-dessus de la hauteur de la clôture commune. Si le mur ne pouvait supporter l'exhaussement, celui qui veut l'exhausser doit le faire reconstruire en entier à ses frais, et l'excédent d'épaisseur doit se prendre de son côté.

Avant d'entreprendre ces travaux il faut toujours prendre le consentement du copropriétaire, ou à son défaut, faire intervenir un expert pour que le nouvel ouvrage ne soit pas nuisible au voisin,

Pour les haies mitoyennes, le produit en appartient aux propriétaires par moitié. L'entretien, la réparation et la reconstruction de la clôture mitoyenne sont à la charge de tous ceux qui y ont droit, proportionnellement aux droits de chacun.

En principe, chaque propriétaire peut se servir de la chose commune pour les besoins de son fonds, à la condition toute-fois qu'il n'entrave pas le droit égal de ses copropriétaires Il peut même apporter des modifications à cette chose pourvu qu'elles ne gênent en rien ces derniers. En revanche, chacun est tenu de participer aux frais communs d'entretien et de réparation comme pour la clôture commune.

Les chemins qui, à la campagne, servent à l'exploitation des parcelles de terre appartenant à des propriétaires différents, et dont l'usage est commun aux diverses parcelles desservies, sont présumés appartenir à titre de propriété exclusive à chaque riverain pour la portion qui borde sa parcelle.

## PROPRIÉTÉ ET USAGE DES EAUX COURANTES

Les eaux courantes représentent une richesse publique dont l'emploi va sans cesse en se développant. Il s'agit donc de concilier, en cette matière plus qu'en toute autre, les droits incontestables de la communauté avec ceux des propriétaires des terrains dans lesquels l'eau surgit ou qu'elle traverse.

Les eaux courantes peuvent se répartir en trois catégories : eaux pluviales, sources et cours d'eau non navigables ni flottables.

La règle traditionnelle veut que la source appartienne au propriétaire du sol, et cette règle veut qu'elle s'applique non seulement aux sources jaillissantes, mais encore aux eaux souterraines, car le propriétaire du sol a le droit incontestable de faire surgir des eaux dans son fonds par des sondages ou des travaux souterrains, quand bien même il priverait le fonds inférieur d'une source qui y jaillissait. Le propriétaire de ce fonds ne pourrait réclamer aucune indemnité pour la privation de l'eau à moins cependant qu'il ne prouve que le propriétaire supérieur a agi méchamment, sans intérêt personne) et uniquement pour lui porter préjudice, car, dans ce cas, il y aurait abus du droit.

Le droit du propriétaire du sol de la source est bien un droit de propriété complet, et on peut dire que le propriétaire a le droit de détourner le cours de la source, de la canaliser et de la vendre à un tiers, sans que le propriétaire inférieur puisse s'y opposer à moins qu'il n'ait acquis soit par titre, soit par la possession prolongée pendant trente ans, un droit à la réception de l'eau.

Le propriétaire de la source subit cependant certaines restrictions dans les cas suivants :

I° Au profit des agglomérations alimentées par l'eau, car l'eau est nécessaire aux habitants d'une commune.

2° Lorsque, dès la sortie du fonds où elles surgissent, les eaux de source forment un cours d'eau ayant le caractère d'eaux publiques et courantes, le propriétaire ne peut les détourner de leur cours naturel au préjudice des usagers inférieurs.

3' Quand il s'agit d'eaux minérales.

Enfin, en ce qui concerne le lit des cours d'eau non navigables ni flottables, celui-ci appartient aux propriétaires des deux rives, chacun ayant la moitié de la propriété du lit suivant une ligne que l'on suppose être tracée au milieu des cours d'eau

Les conséquences de ce droit de propriété sont les suivantes :

I° Le riverain a seul le droit d'extraire le gravier et le sable

2° Si le cours d'eau change de lit, le lit abandonné appartient aux anciens propriétaires.

3° Si un travail public est effectué dans le lit d'une rivière, par exemple s'il faut y asseoir les piles d'un pont, il y a lieu à expropriation pour cause d'utilité publique *et,* par conséquent, à indemnité.

Il convient de dire que, quoique propriétaire du lit, le riverain ne peut rien faire qui modifie le régime des eaux; ainsi aucun barrage, aucune prise d'eau en vue de l'établissement d'un moulin ou d'une usine ne peuvent être pratiqués sans son autorisation. Seules sont permises les coupures aux berges en vue de l'irrigation.

Les riverains ont droit à l'usage des eaux, mais ce droit est plus ou moins étendu selon qu'ils possèdent les deux rives ou une seule

Le riverain d'un seul côté peut se servir de l'eau à son passage pour tous ses besoins, même pour l'irrigation de terres non riveraines, et peut l'utiliser pour ses besoins industriels, sauf autorisation à demander.

Celui dont l'eau traverse l'héritage a, en outre, le droit d'utiliser le cours d'eau comme il l'entend, par exemple de le diviser, d'en former des étangs, sous la seule obligation de le rendre à la sortie du fonds à son cours ordinaire sans diminution anormale de son volume.

Enfin, en ce qui concerne la force motrice, il est bien décidé que nul ne peut disposer de l'énergie des cours d'eau sans une concession ou une autorisation de l'Etat.

Il nous reste enfin, pour compléter notre étude, à mettre sous les yeux de nos lecteurs quelques cas qui peuvent se présenter, qui peuvent donner lieu à des contestations, et sur lesquels nous croyons devoir attirer leur attention.

# **CONSTRUCTIONS FAITES PAR UN FERMIER OU MÉTAYER**

Il arrive souvent qu'un locataire ayant un long bail édifie des constructions en vue de faciliter l'exercice de son droit. Il n'y a pas de difficultés lorsque le contrat prévoit cette faculté et règle le sort des constructions à la fin du bail. Mais, comment faire si le contrat est muet ? Le propriétaire peut-il contraindre le locataire à enlever à ses frais les constructions ou les plantations sans aucune indemnité, et même lui demander des

indemnités s'il y a lieu ? Ou bien, faut-il décider que le propriétaire est obligé de conserver les travaux faits et de payer à son choix le montant de la dépense ou de la plus-value ? La jurisprudence se prononce pour la première solution; le preneur n'avait qu'à s'entendre avec le bailleur avant de commencer les travaux; s'il ne l'a pas fait, il n'a qu'à s'en prendre à lui-même.

#### PERTE DE CERTAINS ANIMAUX

Il est décidé que les pigeons, lapins, poissons qui passent dans un autre colombier, garenne ou étang appartiennent au nouveau propriétaire pourvu qu'ils n'y aient pas été attirés par fraude ou artifice. Il faut observer que ce texte ne s'applique pas aux animaux de basse-cour qui, s'ils échappent, ne cessent pas d'être la propriété de leur maître et peuvent être revendiqués par lui.

La plupart de ces animaux sont considérés libres de circuler.

#### DÉGÂTS CAUSÉS AUX RÉCOLTES PAR LES ANIMAUX

Celui dont les volailles passent sur les propriétés voisines, et y causent des dégâts est tenu de réparer ces dommages. Celui qui les a soufferts peut même tuer les volailles, mais seulement sur le lieu au moment du dégât, et sans pouvoir se les approprier.

L'Administration, en l'occurrence les préfets, peuvent

chaque année, sur l'avis des Conseils généraux, déterminer le temps pendant lequel les colombiers seront fermés; et, pendant ce temps, mais pendant ce temps seulement, les fermiers peuvent s'approprier les pigeons qu'ils auraient tués sur leurs fonds, indépendamment des dommages et intérêts qui peuvent être demandés aux propriétaires de ces volatiles.

Nous espérons que les lignés qui précèdent, non seulement intéresseront nos lecteurs, mais pourront encore leur être, dans la vie quotidienne, de quelque utilité; ce serait notre plus grande satisfaction.

Nous nous permettons encore, après leur avoir rappelé qu'un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès, qu'en toutes circonstances dans la vie, au moment où l'on se demande si l'on a bien le droit d'entreprendre quelque chose, sons risquer de léser le voisin, il est toujours prudent de se redire la vieille maxime :

#### « Ne faites pas aux autres ce que vous ne voudriez pas qu'on vous fit. »

Et, après avoir réfléchi, la voix de la raison se fera toujours entendre.

Ces quelques commentaires de droit rural sont donnés à titre indicatif.

Les lois et leur interprétation étant susceptibles de modification, il est prudent de toujours consulter un avocat, en cas de contestation.

# LE PAYSAN" ET SES COLLABORATEURS

VOUS REMERCIENT D'AVOIR COMPULSÉ LE GUIDE DES SEMIS. ● NOUS SOUHAITONS

QUE CES PAGES VOUS AIENT FOURNI LES RENSEIGNEMENTS QUE VOUS CHERCHIEZ ●

NOUS SERIONS TRÈS HEUREUX DE RECEVOIR TOUTES VOS OBSERVATIONS ◆

ACHEVÉ D'IMPRIMER SUR LES PRESSES

DE L'IMPRIMERIE GEORGES LANG

A PARIS LE 30 JANVIER 1953

DÉPOT LÉGAL INTRIMESTRE Nº B. 4.210



